

flor en el ángulo de las dicotomías es pedunculada. Tallo 0,02-0,03 m.

Provincia de Coquimbo. Cordillera de Santiago (Salto de agua). Setiembre.

15. *Bryopsis*.—Reiche.

Sépalos 4, persistentes, membranosos. Pétalos 4, en alternación con ellos i mucho mas cortos. Estambres 8, mas largos que el cáliz. Anteras dorsifixas, mui caedizas. Ovario prismático-triangular con 3 estilos i pocos (4) óvulos basales i arqueados. Fruto desconocido. Yerba mui pequeña, los individuos agregados en céspedes. Hojas casi escaniformes, colocadas en 4 filas. Flores solitarias terminales. i especie en las cordilleras de Chile. (Este jénero, referido a *Lyallia* por el señor PHILIPPI difiere de él por la existencia de los pétalos, los 8 estambres, las flores terminales, etc.)

* 1. B. ANDICOLA (Phil.) Reiche.—(*Lyallia andicola* Phil. Viaje a la prov de Tarapacá, páj. 7, núm. 27; tab. I, fig. 7.)

Hojas aovado-triángulares, apénas de 1 mm. de largo. Tallos con estolones. Céspedes de 4 cm. de diámetro.

Provincia de Tarapacá (entre Machuca i Copacoya), 3,500 m. Febrero.

16. *Pycnophyllum*.—Remy.

Sépalos 5, persistentes, membranosos. Pétalos 5, enteros o bífidos, o ningunos. Estambres 5, alternantes con los pétalos. Cápsula trígona, con 1 sola semilla.—Yerbas pequeñas, mui ramosas i agregadas en céspedes. Hojas mui tupidas, enteras, sin estípulas, Flores terminales, sésiles.—Unas pocas especies de las Cordilleras; 1 o 2 en Chile.

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| I. Planta pelada..... | 1. <i>molle</i> |
| II. Planta densamente vellosa..... | 2. <i>lanatum</i> |

* 1. P. MOLLE Remy Annal. Sc. nat. III, IV, 355.—(*Stichophyllum bryoides* Phil. flor. atac. páj. 19, núm. 118.; tab. I, fig. D.; *Selaginella rupestris* Lechl.)

Los pétalos trífidos, mas cortos que los sépalos. Hojas puestas en 4 filas a veces algo oblicuas. Tallos 0,04 m.

Provincia de Tarapacá, 3,700.; provincia de Atacama (23°52' l. m.; 4,150 m.) Enero, Febrero.

* ? 2. P. LANATUM Phil. Anal. Univ. Santiago, 1893 (vol. 81) páj. 774.

Planta densamente vellosa; los tallos quebradizos; las hojas puestas en 4 filas. Flores i frutos desconocidos. Tallo 0,04-0,05 m.

Provincia de Coquimbo. (Cordilleras de Illapel).

Observacion. El jénero *Drudea* Griseb. difiere de *Pycnophyllum* en tener 5 hojas carpelares (en lugar de 3), pero es incompletamente conocido. Segun el "catálogo plantarum vascularium chileasium" *Drudea lycopodioides* Griseb. es idéntica con *Colobanthus lycopodioides* Griseb. La cuestion se dilucidará solamente en vista de las muestras orijinales.

17. *Corrigiola*.—L.

Cáliz persistente de 5 divisiones mui profundas. Pétalos 5, blancos, del largo del cáliz. Estambres 5 en alternacion con los pétalos. Un ovario con un óvulo colgante en el ápice de un funículo que sale del fondo de la celda. Estigmas 3. Fruto indehiscente.—Yerbas con los tallos tendidos al suelo; las hojas enteras, estipuladas; las flores pequeñas colocadas en glomérulos que forman espigas interrumpidas; éstas a veces reunidas a manera de corimbos.—Ca. 10 especies parecidas una a otra, de Europa, de los países mediterráneos i de la rejion andina de Sud América. En Chile 4 especies.

I. La raíz engrosada hácia arriba.

A. La inflorescencia es un corímbo terminal.

1. Hojas oblongas-ovaladas..... 1. *latifolia*
2. Hojas lineares..... 2. *telephiifolia*