

リベルサス錠 適正使用のお願い ver2.0

リベルサス錠3mg、7mg、14mg

【効能効果】 2型糖尿病

【用法用量】 1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、
1日1回7mgに増量し維持用量として経口投与
1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合は1日1回14mgに増量できる**重要!** 服用に関する注意点について

- **起床時**など空腹時（**1日の最初の食事・飲水の前**）に1錠服用してください



- 1錠を**120mL以下の水**で服用してください



- **服用時**および**服用後少なくとも30分間**は、**飲食および他の薬の服用を避けて**ください

リベルサス錠は、**他の薬剤と同じタイミングの服用を避ける**必要があります



- 14mgを投与する際に、**7mgを2錠投与することは避けて**ください

本剤は吸収促進剤サルカプロザートナトリウム(SNAC)を添加することで、経口投与を可能にしております。複数錠投与により、SNAC投与量が増えること、物理的に複数の錠剤が胃内に存在することで、**薬効成分の吸収に影響する**可能性があります。

重要! 保管に関する注意点について

- 湿気や光に弱いため、**服用する直前までシートから出さない**でください



- シートで防湿しているため、原則として**シートをミシン目以外で切らない**でください

やむを得ず切り離す場合は、シートのポケット部分を破損しないようにしてください。



当院では、リベルサス錠を処方する際、**偶数の処方日数でのみ処方**できるよう制限をかけております。7日分など奇数の処方日数では処方できませんので、ご了承ください。