

第2部 身体状況調査の結果

第14表 身長・体重の平均値及び標準偏差—年齢階級，身長・体重別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，1歳以上〔体重は妊婦除外〕

	男 性						女 性					
	身 長(cm)			体 重(kg)			身 長(cm)			体 重(kg)		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	2,900	162.4	18.6	2,896	61.8	17.6	3,308	150.3	15.7	3,277	50.0	13.4
1 歳	18	79.7	3.6	19	10.4	1.1	29	77.2	5.9	30	10.2	1.2
2 歳	34	88.6	3.9	34	12.6	1.5	29	87.5	3.4	29	12.3	1.4
3 歳	26	96.0	3.5	26	14.2	1.5	36	96.1	4.7	37	14.6	1.7
4 歳	26	101.2	4.1	26	15.4	1.8	34	102.3	5.2	34	15.9	2.2
5 歳	22	110.0	4.0	22	18.2	2.0	36	109.3	4.7	36	18.1	2.6
6 歳	26	115.6	5.5	26	20.4	2.5	27	114.8	5.9	27	20.3	3.8
7 歳	37	122.0	4.9	37	24.2	5.0	31	119.6	6.1	31	22.3	3.8
8 歳	28	127.8	4.9	28	26.6	5.3	34	125.7	4.5	34	26.0	3.8
9 歳	27	131.8	6.8	27	29.1	5.8	26	134.4	5.8	26	29.7	3.9
10歳	33	138.4	6.5	33	33.8	7.3	30	140.6	7.7	28	33.7	7.6
11歳	33	145.7	8.0	33	38.8	9.9	25	146.6	6.6	25	37.1	6.4
12歳	31	153.1	7.9	31	43.4	8.5	19	150.1	5.7	19	41.9	7.2
13歳	24	160.3	7.6	24	50.4	7.9	24	154.6	5.9	24	47.2	6.7
14歳	17	165.2	6.5	17	51.0	7.5	19	154.9	5.1	19	48.7	6.9
15歳	29	168.0	5.4	29	57.9	9.6	29	158.2	5.1	29	49.5	5.7
16歳	17	173.9	5.2	17	62.6	10.4	25	156.6	3.6	24	49.9	6.8
17歳	27	169.2	5.8	27	57.3	8.9	21	154.8	5.7	21	47.2	6.2
18歳	19	170.0	5.7	19	61.1	9.0	14	157.4	6.0	14	50.1	9.2
19歳	20	174.0	5.1	20	64.3	8.0	15	156.6	6.0	15	51.2	7.7
20歳	15	169.1	6.8	15	61.4	8.5	17	157.0	4.6	17	50.7	7.5
21歳	17	172.5	4.2	17	65.1	6.3	18	157.1	5.0	18	52.2	9.5
22歳	23	172.6	6.8	23	64.0	12.0	14	158.8	2.7	14	52.3	7.8
23歳	10	169.4	6.8	10	62.8	13.9	18	159.3	6.9	17	54.6	10.5
24歳	19	171.5	6.6	19	63.9	9.8	22	157.5	5.0	21	50.9	4.9
25歳	15	173.5	5.1	15	70.3	17.9	19	160.1	7.3	18	53.3	9.1
26-29歳	75	171.7	5.5	75	66.0	10.2	78	159.4	5.9	72	54.0	9.4
30-39歳	268	172.1	6.1	267	71.0	12.3	311	158.3	5.6	295	53.4	8.5
40-49歳	408	171.3	5.8	407	71.1	11.0	424	158.7	5.4	420	55.8	9.3
50-59歳	365	170.8	5.5	363	70.4	10.8	455	157.0	5.3	452	55.2	9.8
60-69歳	504	167.2	6.1	503	67.1	10.3	600	153.9	5.7	599	54.2	9.3
70歳以上	687	162.7	6.3	687	62.7	9.3	829	149.0	6.5	832	51.3	8.8
(再掲)												
20歳以上	2,406	168.0	7.1	2,401	67.3	11.1	2,805	154.5	7.0	2,775	53.5	9.3
20-29歳	174	171.7	5.9	174	65.2	11.1	186	158.7	5.7	177	53.0	8.8
60-64歳	210	168.4	6.3	210	69.0	10.3	262	155.3	5.3	261	55.1	9.9
65-69歳	294	166.4	5.8	293	65.7	10.1	338	152.9	5.7	338	53.4	8.8
70-74歳	260	164.7	5.5	259	64.4	9.1	313	151.2	5.7	313	53.5	9.2
75-79歳	218	163.0	6.4	218	63.3	8.7	229	150.1	5.3	229	51.7	7.9
80歳以上	209	160.0	6.3	210	59.9	9.6	287	145.8	6.8	290	48.6	8.4

注) 女性の体重の集計は妊婦 19 名を除外して行った。

(30年)

第15表 BMIの平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—
男性・女性，15歳以上〔妊婦除外〕

	男 性			女 性		
	人 数	平均値	標準偏差	人 数	平均値	標準偏差
総 数	2,512	23.7	3.4	2,875	22.4	3.7
15-19歳	112	20.7	2.9	103	20.1	2.5
20-29歳	174	22.1	3.5	177	21.0	3.4
30-39歳	267	23.9	3.7	295	21.3	3.1
40-49歳	407	24.2	3.5	420	22.2	3.6
50-59歳	363	24.1	3.6	452	22.3	3.7
60-69歳	503	24.0	3.2	599	22.9	3.7
70歳以上	686	23.6	3.0	829	23.1	3.7
(再掲)						
20歳以上	2,400	23.8	3.4	2,772	22.5	3.7
20-69歳	1,714	23.9	3.5	1,943	22.2	3.6
40-69歳	1,273	24.1	3.4	1,471	22.5	3.7
65-69歳	293	23.7	3.1	338	22.8	3.5
70-74歳	259	23.7	3.1	313	23.4	3.9
75-79歳	218	23.8	2.9	229	23.0	3.5
80-84歳	136	23.6	3.1	149	23.3	3.4
80歳以上	209	23.4	3.1	287	22.8	3.6
85歳以上	73	22.8	2.9	138	22.3	3.7

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦19名を除外した。

(30年)

注2) BMIは体重(kg)／(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第 16 表 BMI の分布－BMI の区分，人数，割合－総数・男性・女性，15 歳以上〔妊婦除外〕

	総 数		男 性		女 性	
	人 数	%	人 数	%	人 数	%
総 数	5,387	100.0	2,512	100.0	2,875	100.0
15未満	9	0.2	0	0.0	9	0.3
15－16未満	29	0.5	3	0.1	26	0.9
16－17未満	82	1.5	30	1.2	52	1.8
17－18未満	183	3.4	48	1.9	135	4.7
18－19未満	316	5.9	70	2.8	246	8.6
19－20未満	479	8.9	176	7.0	303	10.5
20－21未満	626	11.6	229	9.1	397	13.8
21－22未満	594	11.0	258	10.3	336	11.7
22－23未満	592	11.0	294	11.7	298	10.4
23－24未満	588	10.9	321	12.8	267	9.3
24－25未満	498	9.2	302	12.0	196	6.8
25－26未満	422	7.8	243	9.7	179	6.2
26－27未満	300	5.6	175	7.0	125	4.3
27－28未満	192	3.6	115	4.6	77	2.7
28－29未満	164	3.0	73	2.9	91	3.2
29－30未満	107	2.0	72	2.9	35	1.2
30－31未満	59	1.1	28	1.1	31	1.1
31－32未満	47	0.9	27	1.1	20	0.7
32－33未満	35	0.6	15	0.6	20	0.7
33－34未満	28	0.5	15	0.6	13	0.5
34－35未満	10	0.2	5	0.2	5	0.2
35以上	27	0.5	13	0.5	14	0.5

注 1) 身長と体重の測定を行った 15 歳以上の者を集計対象とした。なお，女性は妊婦 19 名を除外した。

(30年)

注 2) BMI は体重 (kg) / (身長 (m))² で算出し，小数点第 3 位で四捨五入した値を使用した。

第17表の1 BMIの状況－年齢階級、肥満度（BMI）別、人数、割合－総数・男性・女性、15歳以上〔妊婦除外〕

	総数	総数		やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	5,387	100.0	458	8.5	3,538	65.7	1,391	25.8	1,105	20.5	1,185	22.0	206	3.8	
	15-19歳	215	100.0	58	27.0	146	67.9	11	5.1	109	50.7	11	5.1	0	0.0	
	20-29歳	351	100.0	55	15.7	246	70.1	50	14.2	122	34.8	42	12.0	8	2.3	
	30-39歳	562	100.0	66	11.7	374	66.5	122	21.7	140	24.9	100	17.8	22	3.9	
	40-49歳	827	100.0	54	6.5	553	66.9	220	26.6	160	19.3	180	21.8	40	4.8	
	50-59歳	815	100.0	60	7.4	533	65.4	222	27.2	152	18.7	184	22.6	38	4.7	
	60-69歳	1,102	100.0	72	6.5	691	62.7	339	30.8	196	17.8	292	26.5	47	4.3	
	70歳以上	1,515	100.0	93	6.1	995	65.7	427	28.2	226	14.9	376	24.8	51	3.4	
	(再掲)															
	20歳以上	5,172	100.0	400	7.7	3,392	65.6	1,380	26.7	996	19.3	1,174	22.7	206	4.0	
20-69歳	3,657	100.0	307	8.4	2,397	65.5	953	26.1	770	21.1	798	21.8	155	4.2		
40-69歳	2,744	100.0	186	6.8	1,777	64.8	781	28.5	508	18.5	656	23.9	125	4.6		
65歳以上	2,146	100.0	133	6.2	1,398	65.1	615	28.7	338	15.8	545	25.4	70	3.3		
65-69歳	631	100.0	40	6.3	403	63.9	188	29.8	112	17.7	169	26.8	19	3.0		
70-74歳	572	100.0	31	5.4	375	65.6	166	29.0	77	13.5	143	25.0	23	4.0		
75-79歳	447	100.0	22	4.9	300	67.1	125	28.0	64	14.3	115	25.7	10	2.2		
80-84歳	285	100.0	12	4.2	185	64.9	88	30.9	36	12.6	77	27.0	11	3.9		
80歳以上	496	100.0	40	8.1	320	64.5	136	27.4	85	17.1	118	23.8	18	3.6		
85歳以上	211	100.0	28	13.3	135	64.0	48	22.7	49	23.2	41	19.4	7	3.3		
男性	総数	2,512	100.0	116	4.6	1,615	64.3	781	31.1	327	13.0	678	27.0	103	4.1	
	15-19歳	112	100.0	27	24.1	77	68.8	8	7.1	52	46.4	8	7.1	0	0.0	
	20-29歳	174	100.0	20	11.5	123	70.7	31	17.8	50	28.7	27	15.5	4	2.3	
	30-39歳	267	100.0	9	3.4	170	63.7	88	33.0	30	11.2	70	26.2	18	6.7	
	40-49歳	407	100.0	10	2.5	249	61.2	148	36.4	40	9.8	122	30.0	26	6.4	
	50-59歳	363	100.0	13	3.6	215	59.2	135	37.2	34	9.4	116	32.0	19	5.2	
	60-69歳	503	100.0	12	2.4	317	63.0	174	34.6	55	10.9	153	30.4	21	4.2	
	70歳以上	686	100.0	25	3.6	464	67.6	197	28.7	66	9.6	182	26.5	15	2.2	
	(再掲)															
	20歳以上	2,400	100.0	89	3.7	1,538	64.1	773	32.2	275	11.5	670	27.9	103	4.3	
20-69歳	1,714	100.0	64	3.7	1,074	62.7	576	33.6	209	12.2	488	28.5	88	5.1		
40-69歳	1,273	100.0	35	2.7	781	61.4	457	35.9	129	10.1	391	30.7	66	5.2		
65歳以上	979	100.0	34	3.5	654	66.8	291	29.7	101	10.3	267	27.3	24	2.5		
65-69歳	293	100.0	9	3.1	190	64.8	94	32.1	35	11.9	85	29.0	9	3.1		
70-74歳	259	100.0	6	2.3	185	71.4	68	26.3	20	7.7	60	23.2	8	3.1		
75-79歳	218	100.0	6	2.8	140	64.2	72	33.0	21	9.6	70	32.1	2	0.9		
80-84歳	136	100.0	6	4.4	89	65.4	41	30.1	14	10.3	36	26.5	5	3.7		
80歳以上	209	100.0	13	6.2	139	66.5	57	27.3	25	12.0	52	24.9	5	2.4		
85歳以上	73	100.0	7	9.6	50	68.5	16	21.9	11	15.1	16	21.9	0	0.0		
女性	総数	2,875	100.0	342	11.9	1,923	66.9	610	21.2	778	27.1	507	17.6	103	3.6	
	15-19歳	103	100.0	31	30.1	69	67.0	3	2.9	57	55.3	3	2.9	0	0.0	
	20-29歳	177	100.0	35	19.8	123	69.5	19	10.7	72	40.7	15	8.5	4	2.3	
	30-39歳	295	100.0	57	19.3	204	69.2	34	11.5	110	37.3	30	10.2	4	1.4	
	40-49歳	420	100.0	44	10.5	304	72.4	72	17.1	120	28.6	58	13.8	14	3.3	
	50-59歳	452	100.0	47	10.4	318	70.4	87	19.2	118	26.1	68	15.0	19	4.2	
	60-69歳	599	100.0	60	10.0	374	62.4	165	27.5	141	23.5	139	23.2	26	4.3	
	70歳以上	829	100.0	68	8.2	531	64.1	230	27.7	160	19.3	194	23.4	36	4.3	
	(再掲)															
	20歳以上	2,772	100.0	311	11.2	1,854	66.9	607	21.9	721	26.0	504	18.2	103	3.7	
20-69歳	1,943	100.0	243	12.5	1,323	68.1	377	19.4	561	28.9	310	16.0	67	3.4		
40-69歳	1,471	100.0	151	10.3	996	67.7	324	22.0	379	25.8	265	18.0	59	4.0		
65歳以上	1,167	100.0	99	8.5	744	63.8	324	27.8	237	20.3	278	23.8	46	3.9		
65-69歳	338	100.0	31	9.2	213	63.0	94	27.8	77	22.8	84	24.9	10	3.0		
70-74歳	313	100.0	25	8.0	190	60.7	98	31.3	57	18.2	83	26.5	15	4.8		
75-79歳	229	100.0	16	7.0	160	69.9	53	23.1	43	18.8	45	19.7	8	3.5		
80-84歳	149	100.0	6	4.0	96	64.4	47	31.5	22	14.8	41	27.5	6	4.0		
80歳以上	287	100.0	27	9.4	181	63.1	79	27.5	60	20.9	66	23.0	13	4.5		
85歳以上	138	100.0	21	15.2	85	61.6	32	23.2	38	27.5	25	18.1	7	5.1		

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦19名を除外した。

注2) BMIは体重(kg)÷(身長(m))²で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

注3) BMIの判定は下記のとおり。

低体重(やせ): 18.5未満

普通: 18.5以上25未満

肥満: 25以上

※年齢調整した、肥満者(BMI ≥ 25kg/m²)の割合(20歳以上)は、男性31.6%、女性19.6%。年齢調整した、やせの者(BMI < 18.5kg/m²)の割合(20歳以上)は、男性4.2%、女性12.7%。年齢調整した、低栄養傾向の者(BMI ≥ 20kg/m²)の割合(65歳以上)は、総数16.0%、男性10.6%、女性20.3%。

年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

(30年)

第 17 表の 2 目標とする BMI の範囲の分布—年齢階級, 目標とする BMI の範囲, 人数, 割合—総数・男性・女性, 18 歳以上〔妊婦除外〕

		総数		範囲未満		範囲内		範囲以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	総数	5,240	100.0	991	18.9	2,864	54.7	1,385	26.4
	18-49歳	1,808	100.0	191	10.6	1,220	67.5	397	22.0
	50-69歳	1,917	100.0	345	18.0	1,011	52.7	561	29.3
	70歳以上	1,515	100.0	455	30.0	633	41.8	427	28.2
	(再掲)								
	18-19歳	68	100.0	16	23.5	47	69.1	5	7.4
	20-29歳	351	100.0	55	15.7	246	70.1	50	14.2
	30-39歳	562	100.0	66	11.7	374	66.5	122	21.7
	40-49歳	827	100.0	54	6.5	553	66.9	220	26.6
	50-59歳	815	100.0	151	18.5	442	54.2	222	27.2
	60-69歳	1,102	100.0	194	17.6	569	51.6	339	30.8
	70-79歳	1,019	100.0	285	28.0	443	43.5	291	28.6
	80歳以上	496	100.0	170	34.3	190	38.3	136	27.4
65歳以上	2,146	100.0	566	26.4	965	45.0	615	28.7	
65-74歳	1,203	100.0	279	23.2	570	47.4	354	29.4	
75歳以上	943	100.0	287	30.4	395	41.9	261	27.7	
男 性	総数	2,439	100.0	294	12.1	1,369	56.1	776	31.8
	18-49歳	887	100.0	47	5.3	570	64.3	270	30.4
	50-69歳	866	100.0	89	10.3	468	54.0	309	35.7
	70歳以上	686	100.0	158	23.0	331	48.3	197	28.7
	(再掲)								
	18-19歳	39	100.0	8	20.5	28	71.8	3	7.7
	20-29歳	174	100.0	20	11.5	123	70.7	31	17.8
	30-39歳	267	100.0	9	3.4	170	63.7	88	33.0
	40-49歳	407	100.0	10	2.5	249	61.2	148	36.4
	50-59歳	363	100.0	34	9.4	194	53.4	135	37.2
	60-69歳	503	100.0	55	10.9	274	54.5	174	34.6
	70-79歳	477	100.0	106	22.2	231	48.4	140	29.4
	80歳以上	209	100.0	52	24.9	100	47.8	57	27.3
65歳以上	979	100.0	193	19.7	495	50.6	291	29.7	
65-74歳	552	100.0	98	17.8	292	52.9	162	29.3	
75歳以上	427	100.0	95	22.2	203	47.5	129	30.2	
女 性	総数	2,801	100.0	697	24.9	1,495	53.4	609	21.7
	18-49歳	921	100.0	144	15.6	650	70.6	127	13.8
	50-69歳	1,051	100.0	256	24.4	543	51.7	252	24.0
	70歳以上	829	100.0	297	35.8	302	36.4	230	27.7
	(再掲)								
	18-19歳	29	100.0	8	27.6	19	65.5	2	6.9
	20-29歳	177	100.0	35	19.8	123	69.5	19	10.7
	30-39歳	295	100.0	57	19.3	204	69.2	34	11.5
	40-49歳	420	100.0	44	10.5	304	72.4	72	17.1
	50-59歳	452	100.0	117	25.9	248	54.9	87	19.2
	60-69歳	599	100.0	139	23.2	295	49.2	165	27.5
	70-79歳	542	100.0	179	33.0	212	39.1	151	27.9
	80歳以上	287	100.0	118	41.1	90	31.4	79	27.5
65歳以上	1,167	100.0	373	32.0	470	40.3	324	27.8	
65-74歳	651	100.0	181	27.8	278	42.7	192	29.5	
75歳以上	516	100.0	192	37.2	192	37.2	132	25.6	

注 1) 身長と体重の測定を行った 18 歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦 19 名を除外した。(30年)
 注 2) BMI は体重 (kg) / (身長 (m))² で算出し、小数点第 3 位で四捨五入した値を使用した。

<参考> 目標とする BMI の範囲 (18 歳以上)^{1,2}

年齢(歳)	目標とするBMI (kg/m ²)
18-49	18.5-24.9
50-69	20.0-24.9
70以上	21.5-24.9 ³

¹ 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

² 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かった BMI を基に、疾患別の発症率と BMI との関連、死因と BMI との関連、日本人の BMI の実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。

³ 70 歳以上では、総死亡率が最も低かった BMI と実態との乖離が見られるため、虚弱の予防及び生活習慣病の予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とする BMI の範囲を 21.5-24.9 とした。(厚生労働省「日本人の食事摂取基準 2015 年版」)

第18表 学校保健統計調査方式による肥満区分—学校保健統計調査方式による肥満区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 6-14歳

		総数		6-8歳		9-11歳		12-14歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	489	100.0	183	100.0	172	100.0	134	100.0
	-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%超～-20%以下	17	3.5	4	2.2	7	4.1	6	4.5
	-20%超～-10%以下	102	20.9	32	17.5	43	25.0	27	20.1
	-10%超～0%未満	166	33.9	72	39.3	54	31.4	40	29.9
	0%以上～+10%未満	117	23.9	45	24.6	35	20.3	37	27.6
	+10%以上～+20%未満	55	11.2	19	10.4	19	11.0	17	12.7
	+20%以上～+30%未満	17	3.5	3	1.6	8	4.7	6	4.5
	+30%以上～+40%未満	9	1.8	6	3.3	2	1.2	1	0.7
	+40%以上～+50%未満	4	0.8	2	1.1	2	1.2	0	0.0
+50%以上	2	0.4	0	0.0	2	1.2	0	0.0	
男性	総数	256	100.0	91	100.0	93	100.0	72	100.0
	-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%超～-20%以下	10	3.9	2	2.2	4	4.3	4	5.6
	-20%超～-10%以下	51	19.9	16	17.6	22	23.7	13	18.1
	-10%超～0%未満	88	34.4	35	38.5	28	30.1	25	34.7
	0%以上～+10%未満	61	23.8	24	26.4	19	20.4	18	25.0
	+10%以上～+20%未満	27	10.5	10	11.0	9	9.7	8	11.1
	+20%以上～+30%未満	10	3.9	0	0.0	7	7.5	3	4.2
	+30%以上～+40%未満	6	2.3	4	4.4	1	1.1	1	1.4
	+40%以上～+50%未満	2	0.8	0	0.0	2	2.2	0	0.0
+50%以上	1	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	
女性	総数	233	100.0	92	100.0	79	100.0	62	100.0
	-30%以下	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	-30%超～-20%以下	7	3.0	2	2.2	3	3.8	2	3.2
	-20%超～-10%以下	51	21.9	16	17.4	21	26.6	14	22.6
	-10%超～0%未満	78	33.5	37	40.2	26	32.9	15	24.2
	0%以上～+10%未満	56	24.0	21	22.8	16	20.3	19	30.6
	+10%以上～+20%未満	28	12.0	9	9.8	10	12.7	9	14.5
	+20%以上～+30%未満	7	3.0	3	3.3	1	1.3	3	4.8
	+30%以上～+40%未満	3	1.3	2	2.2	1	1.3	0	0.0
	+40%以上～+50%未満	2	0.9	2	2.2	0	0.0	0	0.0
+50%以上	1	0.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	

注1) 身長と体重の測定を行った6-14歳の者を集計対象とした。

(30年)

注2) 学校保健統計調査方式による区分は, p.14参照。

第19表 腹囲の分布－腹囲の区分，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔妊婦除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	4,625	100.0	301	100.0	507	100.0	715	100.0	726	100.0	1,010	100.0	1,366	100.0	2,974	100.0
50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0
55-60	18	0.4	7	2.3	3	0.6	2	0.3	0	0.0	2	0.2	4	0.3	4	0.1
60-65	96	2.1	16	5.3	20	3.9	14	2.0	8	1.1	18	1.8	20	1.5	47	1.6
65-70	299	6.5	57	18.9	58	11.4	52	7.3	53	7.3	38	3.8	41	3.0	158	5.3
70-75	533	11.5	71	23.6	78	15.4	105	14.7	99	13.6	92	9.1	88	6.4	340	11.4
75-80	692	15.0	54	17.9	101	19.9	135	18.9	115	15.8	132	13.1	155	11.3	441	14.8
80-85	900	19.5	45	15.0	97	19.1	148	20.7	140	19.3	183	18.1	287	21.0	584	19.6
85-90	844	18.2	26	8.6	59	11.6	105	14.7	125	17.2	212	21.0	317	23.2	553	18.6
90-95	597	12.9	12	4.0	45	8.9	63	8.8	90	12.4	160	15.8	227	16.6	403	13.6
95-100	368	8.0	5	1.7	18	3.6	53	7.4	45	6.2	104	10.3	143	10.5	253	8.5
100-105	154	3.3	3	1.0	15	3.0	21	2.9	26	3.6	44	4.4	45	3.3	109	3.7
105-110	76	1.6	2	0.7	8	1.6	11	1.5	16	2.2	16	1.6	23	1.7	50	1.7
110-115	24	0.5	2	0.7	3	0.6	4	0.6	3	0.4	4	0.4	8	0.6	14	0.5
115-120	14	0.3	1	0.3	1	0.2	2	0.3	3	0.4	3	0.3	4	0.3	10	0.3
120cm以上	9	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.4	2	0.2	3	0.2	7	0.2
(再掲)<85cm(男)/<90cm(女)	2,907	62.9	258	85.7	380	75.0	494	69.1	470	64.7	557	55.1	748	54.8	1,812	60.9
(再掲)≥85cm(男)/≥90cm(女)	1,718	37.1	43	14.3	127	25.0	221	30.9	256	35.3	453	44.9	618	45.2	1,162	39.1
男性	2,115	100.0	151	100.0	231	100.0	342	100.0	312	100.0	459	100.0	620	100.0	1,351	100.0
50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-60	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
60-65	13	0.6	5	3.3	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.6	3	0.2
65-70	48	2.3	13	8.6	5	2.2	9	2.6	5	1.6	4	0.9	12	1.9	20	1.5
70-75	136	6.4	32	21.2	24	10.4	17	5.0	22	7.1	17	3.7	24	3.9	67	5.0
75-80	259	12.2	32	21.2	39	16.9	54	15.8	30	9.6	49	10.7	55	8.9	156	11.5
80-85	449	21.2	32	21.2	57	24.7	85	24.9	72	23.1	79	17.2	124	20.0	293	21.7
85-90	476	22.5	18	11.9	36	15.6	67	19.6	70	22.4	120	26.1	165	26.6	316	23.4
90-95	350	16.5	11	7.3	30	13.0	42	12.3	55	17.6	92	20.0	120	19.4	235	17.4
95-100	214	10.1	3	2.0	13	5.6	41	12.0	25	8.0	57	12.4	75	12.1	147	10.9
100-105	94	4.4	3	2.0	14	6.1	17	5.0	16	5.1	24	5.2	20	3.2	64	4.7
105-110	47	2.2	0	0.0	7	3.0	7	2.0	11	3.5	10	2.2	12	1.9	33	2.4
110-115	17	0.8	1	0.7	2	0.9	3	0.9	2	0.6	4	0.9	5	0.8	10	0.7
115-120	5	0.2	1	0.7	1	0.4	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.2	3	0.2
120cm以上	6	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.6	1	0.2	2	0.3	4	0.3
(再掲)<85cm	906	42.8	114	75.5	127	55.0	165	48.2	129	41.3	151	32.9	220	35.5	539	39.9
(再掲)≥85cm	1,209	57.2	37	24.5	104	45.0	177	51.8	183	58.7	308	67.1	400	64.5	812	60.1
女性	2,510	100.0	150	100.0	276	100.0	373	100.0	414	100.0	551	100.0	746	100.0	1,623	100.0
50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1
55-60	17	0.7	7	4.7	3	1.1	2	0.5	0	0.0	2	0.4	3	0.4	4	0.2
60-65	83	3.3	11	7.3	18	6.5	14	3.8	8	1.9	16	2.9	16	2.1	44	2.7
65-70	251	10.0	44	29.3	53	19.2	43	11.5	48	11.6	34	6.2	29	3.9	138	8.5
70-75	397	15.8	39	26.0	54	19.6	88	23.6	77	18.6	75	13.6	64	8.6	273	16.8
75-80	433	17.3	22	14.7	62	22.5	81	21.7	85	20.5	83	15.1	100	13.4	285	17.6
80-85	451	18.0	13	8.7	40	14.5	63	16.9	68	16.4	104	18.9	163	21.8	291	17.9
85-90	368	14.7	8	5.3	23	8.3	38	10.2	55	13.3	92	16.7	152	20.4	237	14.6
90-95	247	9.8	1	0.7	15	5.4	21	5.6	35	8.5	68	12.3	107	14.3	168	10.4
95-100	154	6.1	2	1.3	5	1.8	12	3.2	20	4.8	47	8.5	68	9.1	106	6.5
100-105	60	2.4	0	0.0	1	0.4	4	1.1	10	2.4	20	3.6	25	3.4	45	2.8
105-110	29	1.2	2	1.3	1	0.4	4	1.1	5	1.2	6	1.1	11	1.5	17	1.0
110-115	7	0.3	1	0.7	1	0.4	1	0.3	1	0.2	0	0.0	3	0.4	4	0.2
115-120	9	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	3	0.5	3	0.4	7	0.4
120cm以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.1	3	0.2
(再掲)<90cm	2,001	79.7	144	96.0	253	91.7	329	88.2	341	82.4	406	73.7	528	70.8	1,273	78.4
(再掲)≥90cm	509	20.3	6	4.0	23	8.3	44	11.8	73	17.6	145	26.3	218	29.2	350	21.6

注) 腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお女性は妊婦6名を除外した。

(30年)

第20表 BMI・腹囲の分布—BMI・腹囲の区分, 人数, 年齢階級別, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳			
		人数	%	人数	%	人数	%										
総数	総数	4,616	100.0	301	100.0	504	100.0	714	100.0	724	100.0	1,009	100.0	1,364	100.0	2,969	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm(男)/90cm(女)	2,674	57.9	244	81.1	350	69.4	453	63.4	438	60.5	509	50.4	680	49.9	1,666	56.1
	BMIのみ超(BMI \geq 25)	228	4.9	14	4.7	27	5.4	41	5.7	30	4.1	48	4.8	68	5.0	144	4.9
	腹囲のみ超(腹囲 \geq 85cm(男)/90cm(女))	689	14.9	15	5.0	44	8.7	71	9.9	88	12.2	178	17.6	293	21.5	442	14.9
	BMI \geq 25, 腹囲 \geq 85cm(男)/90cm(女)	1,025	22.2	28	9.3	83	16.5	149	20.9	168	23.2	274	27.2	323	23.7	717	24.1
男性	総数	2,111	100.0	151	100.0	230	100.0	342	100.0	311	100.0	458	100.0	619	100.0	1,348	100.0
	BMI<25, 腹囲<85cm	865	41.0	109	72.2	116	50.4	152	44.4	123	39.5	149	32.5	216	34.9	515	38.2
	BMIのみ超(BMI \geq 25)	39	1.8	5	3.3	10	4.3	13	3.8	5	1.6	2	0.4	4	0.6	23	1.7
	腹囲のみ超(腹囲 \geq 85cm)	556	26.3	15	9.9	38	16.5	63	18.4	72	23.2	143	31.2	225	36.3	363	26.9
	BMI \geq 25, 腹囲 \geq 85cm	651	30.8	22	14.6	66	28.7	114	33.3	111	35.7	164	35.8	174	28.1	447	33.2
女性	総数	2,505	100.0	150	100.0	274	100.0	372	100.0	413	100.0	551	100.0	745	100.0	1,621	100.0
	BMI<25, 腹囲<90cm	1,809	72.2	135	90.0	234	85.4	301	80.9	315	76.3	360	65.3	464	62.3	1,151	71.0
	BMIのみ超(BMI \geq 25)	189	7.5	9	6.0	17	6.2	28	7.5	25	6.1	46	8.3	64	8.6	121	7.5
	腹囲のみ超(腹囲 \geq 90cm)	133	5.3	0	0.0	6	2.2	8	2.2	16	3.9	35	6.4	68	9.1	79	4.9
	BMI \geq 25, 腹囲 \geq 90cm	374	14.9	6	4.0	17	6.2	35	9.4	57	13.8	110	20.0	149	20.0	270	16.7

注) 身長, 体重及び腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお, 女性は妊婦6名を除外した。

(30年)

(参考) 内臓脂肪型肥満の診断基準:

- BMI 25以上で, 男性のウエスト周囲径 85cm以上,
女性のウエスト周囲径 90cm以上を上半身肥満の疑いとする。
- 上半身肥満の疑いと判定され, 腹部CT法による内臓脂肪面積 100cm²以上(男女とも)を内臓脂肪型肥満と診断する。
(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会, 2000年)

※国民健康・栄養調査の「腹囲」は, 「立位のへその高さ」で計測したが, 計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

第21表 薬の服用状況—薬の服用状況, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	3,568	100.0	173	100.0	368	100.0	484	100.0	534	100.0	828	100.0	1,181	100.0
	使用なし	2,185	61.2	173	100.0	355	96.5	437	90.3	387	72.5	439	53.0	394	33.4
	使用あり(一つ以上)	1,383	38.8	0	0.0	13	3.5	47	9.7	147	27.5	389	47.0	787	66.6
	血圧を下げる薬	1,023	28.7	0	0.0	2	0.5	21	4.3	90	16.9	270	32.6	640	54.2
	脈の乱れを治す薬	126	3.5	0	0.0	2	0.5	3	0.6	7	1.3	28	3.4	86	7.3
	コレステロールを下げる薬	642	18.0	0	0.0	5	1.4	11	2.3	64	12.0	197	23.8	365	30.9
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	183	5.1	0	0.0	0	0.0	5	1.0	20	3.7	53	6.4	105	8.9
	貧血治療のための薬(鉄剤)	54	1.5	0	0.0	6	1.6	10	2.1	6	1.1	4	0.5	28	2.4
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	219	6.1	0	0.0	0	0.0	8	1.7	24	4.5	76	9.2	111	9.4
男性	総数	1,517	100.0	70	100.0	147	100.0	205	100.0	209	100.0	362	100.0	524	100.0
	使用なし	884	58.3	70	100.0	145	98.6	178	86.8	129	61.7	175	48.3	187	35.7
	使用あり(一つ以上)	633	41.7	0	0.0	2	1.4	27	13.2	80	38.3	187	51.7	337	64.3
	血圧を下げる薬	493	32.5	0	0.0	1	0.7	17	8.3	55	26.3	141	39.0	279	53.2
	脈の乱れを治す薬	65	4.3	0	0.0	0	0.0	3	1.5	4	1.9	17	4.7	41	7.8
	コレステロールを下げる薬	222	14.6	0	0.0	1	0.7	7	3.4	28	13.4	68	18.8	118	22.5
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	95	6.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	16	7.7	31	8.6	47	9.0
	貧血治療のための薬(鉄剤)	13	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.6	10	1.9
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	142	9.4	0	0.0	0	0.0	6	2.9	20	9.6	47	13.0	69	13.2
女性	総数	2,051	100.0	103	100.0	221	100.0	279	100.0	325	100.0	466	100.0	657	100.0
	使用なし	1,301	63.4	103	100.0	210	95.0	259	92.8	258	79.4	264	56.7	207	31.5
	使用あり(一つ以上)	750	36.6	0	0.0	11	5.0	20	7.2	67	20.6	202	43.3	450	68.5
	血圧を下げる薬	530	25.8	0	0.0	1	0.5	4	1.4	35	10.8	129	27.7	361	54.9
	脈の乱れを治す薬	61	3.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	3	0.9	11	2.4	45	6.8
	コレステロールを下げる薬	420	20.5	0	0.0	4	1.8	4	1.4	36	11.1	129	27.7	247	37.6
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	88	4.3	0	0.0	0	0.0	4	1.4	4	1.2	22	4.7	58	8.8
	貧血治療のための薬(鉄剤)	41	2.0	0	0.0	6	2.7	10	3.6	5	1.5	2	0.4	18	2.7
	インスリン注射又は血糖を下げる薬	77	3.8	0	0.0	0	0.0	2	0.7	4	1.2	29	6.2	42	6.4

注1) 血圧を下げる薬, 脈の乱れを治す薬, コレステロールを下げる薬, 中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬, 貧血治療のための薬(鉄剤), 及びインスリン注射又は血糖を下げる薬の服用状況に回答した者を集計対象とした。(30年)

注2) 複数回答。

注3) 身体状況調査の問診「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「無」と回答した者, (7)に「有」かつ「(7-1) 現在, 糖尿病治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「無」と回答した者, 及び(7)及び(7-1)に「有」かつ「(7-2) インスリン注射または血糖を下げる薬を使っている」に回答しなかった者又は「(7-2) 通院による定期的な血液の検査や生活の改善指導を受けている」に回答しなかった者を, 現在の状況を「無」とした。

第22表の1 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*
総 数	総 数	3,132	100.0	780	24.9	590	18.8	646	20.6	820	26.2	235	7.5	61	1.9	568	18.1
	20-29歳	140	100.0	99	70.7	26	18.6	10	7.1	4	2.9	0	0.0	1	0.7	2	1.4
	30-39歳	306	100.0	194	63.4	61	19.9	27	8.8	17	5.6	4	1.3	3	1.0	3	1.0
	40-49歳	400	100.0	177	44.3	87	21.8	57	14.3	60	15.0	16	4.0	3	0.8	14	3.5
	50-59歳	459	100.0	100	21.8	106	23.1	92	20.0	117	25.5	35	7.6	9	2.0	45	9.8
	60-69歳	752	100.0	110	14.6	141	18.8	182	24.2	241	32.0	61	8.1	17	2.3	148	19.7
	70歳以上	1,075	100.0	100	9.3	169	15.7	278	25.9	381	35.4	119	11.1	28	2.6	356	33.1
	(再掲) 65-74歳	861	100.0	110	12.8	145	16.8	215	25.0	285	33.1	85	9.9	21	2.4	220	25.6
	(再掲) 75歳以上	664	100.0	56	8.4	110	16.6	165	24.8	246	37.0	70	10.5	17	2.6	240	36.1
男 性	総 数	1,287	100.0	191	14.8	225	17.5	298	23.2	415	32.2	127	9.9	31	2.4	254	19.7
	20-29歳	56	100.0	31	55.4	14	25.0	8	14.3	3	5.4	0	0.0	0	0.0	2	3.6
	30-39歳	108	100.0	42	38.9	31	28.7	16	14.8	13	12.0	4	3.7	2	1.9	2	1.9
	40-49歳	158	100.0	35	22.2	38	24.1	28	17.7	43	27.2	13	8.2	1	0.6	6	3.8
	50-59歳	166	100.0	15	9.0	33	19.9	36	21.7	57	34.3	21	12.7	4	2.4	20	12.0
	60-69歳	325	100.0	27	8.3	41	12.6	88	27.1	131	40.3	27	8.3	11	3.4	67	20.6
	70歳以上	474	100.0	41	8.6	68	14.3	122	25.7	168	35.4	62	13.1	13	2.7	157	33.1
	(再掲) 65-74歳	376	100.0	33	8.8	49	13.0	101	26.9	140	37.2	41	10.9	12	3.2	101	26.9
	(再掲) 75歳以上	295	100.0	24	8.1	47	15.9	72	24.4	109	36.9	36	12.2	7	2.4	106	35.9
女 性	総 数	1,845	100.0	589	31.9	365	19.8	348	18.9	405	22.0	108	5.9	30	1.6	314	17.0
	20-29歳	84	100.0	68	81.0	12	14.3	2	2.4	1	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0
	30-39歳	198	100.0	152	76.8	30	15.2	11	5.6	4	2.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	40-49歳	242	100.0	142	58.7	49	20.2	29	12.0	17	7.0	3	1.2	2	0.8	8	3.3
	50-59歳	293	100.0	85	29.0	73	24.9	56	19.1	60	20.5	14	4.8	5	1.7	25	8.5
	60-69歳	427	100.0	83	19.4	100	23.4	94	22.0	110	25.8	34	8.0	6	1.4	81	19.0
	70歳以上	601	100.0	59	9.8	101	16.8	156	26.0	213	35.4	57	9.5	15	2.5	199	33.1
	(再掲) 65-74歳	485	100.0	77	15.9	96	19.8	114	23.5	145	29.9	44	9.1	9	1.9	119	24.5
	(再掲) 75歳以上	369	100.0	32	8.7	63	17.1	93	25.2	137	37.1	34	9.2	10	2.7	134	36.3

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類はp.15を参照。

* 総数に対する割合

第22表の2 血圧の状況—年齢階級, 日本高血圧学会による血圧の分類別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数		至適血圧		正常血圧		正常高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲)収縮期高血圧		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%*	
総数	総数	2,198	100.0	723	32.9	449	20.4	393	17.9	449	20.4	141	6.4	43	2.0	262	11.9
	20-29歳	140	100.0	99	70.7	26	18.6	10	7.1	4	2.9	0	0.0	1	0.7	2	1.4
	30-39歳	306	100.0	194	63.4	61	19.9	27	8.8	17	5.6	4	1.3	3	1.0	3	1.0
	40-49歳	383	100.0	176	46.0	83	21.7	56	14.6	50	13.1	15	3.9	3	0.8	13	3.4
	50-59歳	379	100.0	98	25.9	95	25.1	69	18.2	85	22.4	25	6.6	7	1.8	35	9.2
	60-69歳	502	100.0	93	18.5	98	19.5	110	21.9	147	29.3	38	7.6	16	3.2	86	17.1
	70歳以上	488	100.0	63	12.9	86	17.6	121	24.8	146	29.9	59	12.1	13	2.7	123	25.2
	(再掲)65-74歳	508	100.0	88	17.3	87	17.1	111	21.9	159	31.3	49	9.6	14	2.8	116	22.8
	(再掲)75歳以上	262	100.0	29	11.1	52	19.8	64	24.4	77	29.4	32	12.2	8	3.1	67	25.6
男性	総数	837	100.0	168	20.1	166	19.8	177	21.1	224	26.8	80	9.6	22	2.6	110	13.1
	20-29歳	56	100.0	31	55.4	14	25.0	8	14.3	3	5.4	0	0.0	0	0.0	2	3.6
	30-39歳	108	100.0	42	38.9	31	28.7	16	14.8	13	12.0	4	3.7	2	1.9	2	1.9
	40-49歳	145	100.0	35	24.1	34	23.4	27	18.6	36	24.8	12	8.3	1	0.7	5	3.4
	50-59歳	119	100.0	15	12.6	29	24.4	24	20.2	35	29.4	13	10.9	3	2.5	14	11.8
	60-69歳	194	100.0	21	10.8	24	12.4	45	23.2	78	40.2	15	7.7	11	5.7	37	19.1
	70歳以上	215	100.0	24	11.2	34	15.8	57	26.5	59	27.4	36	16.7	5	2.3	50	23.3
	(再掲)65-74歳	204	100.0	25	12.3	27	13.2	50	24.5	73	35.8	21	10.3	8	3.9	46	22.5
	(再掲)75歳以上	121	100.0	11	9.1	21	17.4	32	26.4	33	27.3	21	17.4	3	2.5	30	24.8
女性	総数	1,361	100.0	555	40.8	283	20.8	216	15.9	225	16.5	61	4.5	21	1.5	152	11.2
	20-29歳	84	100.0	68	81.0	12	14.3	2	2.4	1	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0
	30-39歳	198	100.0	152	76.8	30	15.2	11	5.6	4	2.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	40-49歳	238	100.0	141	59.2	49	20.6	29	12.2	14	5.9	3	1.3	2	0.8	8	3.4
	50-59歳	260	100.0	83	31.9	66	25.4	45	17.3	50	19.2	12	4.6	4	1.5	21	8.1
	60-69歳	308	100.0	72	23.4	74	24.0	65	21.1	69	22.4	23	7.5	5	1.6	49	15.9
	70歳以上	273	100.0	39	14.3	52	19.0	64	23.4	87	31.9	23	8.4	8	2.9	73	26.7
	(再掲)65-74歳	304	100.0	63	20.7	60	19.7	61	20.1	86	28.3	28	9.2	6	2.0	70	23.0
	(再掲)75歳以上	141	100.0	18	12.8	31	22.0	32	22.7	44	31.2	11	7.8	5	3.5	37	26.2

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類は p.15 を参照。

* 総数に対する割合

第23表の1 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の分布—収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の区分、年齢階級別、人数、割合—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳				
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
男	収縮期(最高)血圧	総数	1,287	100.0	56	100.0	108	100.0	158	100.0	166	100.0	325	100.0	474	100.0	1,113	100.0		
		90mmHg未満	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
		90-99	11	0.9	3	5.4	4	3.7	3	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.4		
		100-109	70	5.4	14	25.0	20	18.5	16	10.1	9	5.4	4	1.2	7	1.5	36	3.2		
		110-119	168	13.1	17	30.4	30	27.8	33	20.9	21	12.7	30	9.2	37	7.8	121	10.9		
		120-129	257	20.0	13	23.2	26	24.1	43	27.2	39	23.5	58	17.8	78	16.5	215	19.3		
		130-139	314	24.4	7	12.5	11	10.2	39	24.7	41	24.7	92	28.3	124	26.2	293	26.3		
		140-149	229	17.8	2	3.6	10	9.3	16	10.1	31	18.7	70	21.5	100	21.1	216	19.4		
		150-159	135	10.5	0	0.0	4	3.7	5	3.2	16	9.6	45	13.8	65	13.7	129	11.6		
		160-169	61	4.7	0	0.0	1	0.9	3	1.9	5	3.0	11	3.4	41	8.6	59	5.3		
		170-179	19	1.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	1.8	4	1.2	11	2.3	18	1.6		
		180mmHg以上	22	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	11	3.4	10	2.1	22	2.0		
		女	拡張期(最低)血圧	総数	1,287	100.0	56	100.0	108	100.0	158	100.0	166	100.0	325	100.0	474	100.0	1,113	100.0
				40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				40-49	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.2
				50-59	23	1.8	1	1.8	3	2.8	1	0.6	2	1.2	2	0.6	14	3.0	19	1.7
				60-69	129	10.0	16	28.6	13	12.0	9	5.7	5	3.0	20	6.2	66	13.9	98	8.8
				70-79	364	28.3	21	37.5	39	36.1	38	24.1	33	19.9	72	22.2	161	34.0	298	26.8
				80-89	450	35.0	17	30.4	36	33.3	59	37.3	64	38.6	129	39.7	145	30.6	396	35.6
90-99	231			17.9	1	1.8	11	10.2	38	24.1	43	25.9	75	23.1	63	13.3	218	19.6		
100-109	72			5.6	0	0.0	4	3.7	12	7.6	15	9.0	22	6.8	19	4.0	68	6.1		
110-119	13			1.0	0	0.0	1	0.9	1	0.6	3	1.8	4	1.2	4	0.8	12	1.1		
120-129	3			0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	1	0.3	0	0.0	2	0.2		
130-139	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女	収縮期(最高)血圧			総数	1,845	100.0	84	100.0	198	100.0	242	100.0	293	100.0	427	100.0	601	100.0	1,539	100.0
				90mmHg未満	5	0.3	0	0.0	4	2.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
				90-99	65	3.5	13	15.5	26	13.1	16	6.6	3	1.0	6	1.4	1	0.2	26	1.7
				100-109	265	14.4	32	38.1	76	38.4	64	26.4	43	14.7	29	6.8	21	3.5	156	10.1
				110-119	321	17.4	27	32.1	55	27.8	76	31.4	53	18.1	64	15.0	46	7.7	237	15.4
				120-129	374	20.3	10	11.9	26	13.1	45	18.6	80	27.3	103	24.1	110	18.3	332	21.6
		130-139	336	18.2	1	1.2	9	4.5	23	9.5	54	18.4	95	22.2	154	25.6	321	20.9		
		140-149	248	13.4	0	0.0	1	0.5	12	5.0	32	10.9	68	15.9	135	22.5	240	15.6		
		150-159	119	6.4	0	0.0	0	0.0	3	1.2	15	5.1	30	7.0	71	11.8	117	7.6		
		160-169	64	3.5	1	1.2	0	0.0	0	0.0	6	2.0	24	5.6	33	5.5	63	4.1		
		170-179	29	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	1.7	5	1.2	18	3.0	28	1.8		
		180mmHg以上	19	1.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.7	3	0.7	12	2.0	18	1.2		
		女	拡張期(最低)血圧	総数	1,845	100.0	84	100.0	198	100.0	242	100.0	293	100.0	427	100.0	601	100.0	1,539	100.0
				40mmHg未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
				50-59	71	3.8	12	14.3	15	7.6	9	3.7	5	1.7	5	1.2	25	4.2	39	2.5
				60-69	370	20.1	34	40.5	84	42.4	62	25.6	45	15.4	45	10.5	100	16.6	247	16.0
				70-79	655	35.5	28	33.3	70	35.4	107	44.2	80	27.3	156	36.5	214	35.6	551	35.8
				80-89	519	28.1	8	9.5	24	12.1	50	20.7	109	37.2	152	35.6	176	29.3	484	31.4
90-99	168			9.1	1	1.2	3	1.5	9	3.7	39	13.3	52	12.2	64	10.6	159	10.3		
100-109	45			2.4	0	0.0	0	0.0	3	1.2	10	3.4	14	3.3	18	3.0	45	2.9		
110-119	15			0.8	1	1.2	1	0.5	2	0.8	4	1.4	3	0.7	4	0.7	13	0.8		
120-129	1			0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1		
130-139	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。
 ※年齢調整した、収縮期(最高)血圧が140mmHg以上の者の割合(20歳以上)は、男性28.0%、女性19.0%。
 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第23表の2 収縮期(最高)・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	1,287	134.7	17.7	56	116.8	11.2	108	120.9	15.6	158	126.0	13.7	166	134.1	15.8	325	138.8	15.9	474	140.3	17.6	1,113	136.9	17.0
	拡張期(最低)血圧	1,287	82.3	11.3	56	74.1	8.3	108	79.6	11.6	158	84.3	10.0	166	86.8	10.9	325	85.1	10.6	474	79.8	11.3	1,113	83.1	11.2
女性	収縮期(最高)血圧	1,845	127.9	19.1	84	109.5	11.4	198	110.2	12.6	242	116.5	14.6	293	126.9	17.3	427	132.2	17.0	601	138.5	16.9	1,539	131.1	18.4
	拡張期(最低)血圧	1,845	77.4	10.9	84	69.1	9.9	198	70.4	9.6	242	74.9	10.0	293	80.6	11.2	427	80.2	9.8	601	78.2	10.7	1,539	78.8	10.6

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。
 ※年齢調整した、収縮期(最高)血圧の平均値(20歳以上)は、男性130.3mmHg、女性123.3mmHg。
 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第23表の3 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の分布－収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の区分、年齢階級別、人数、割合－男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-89歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男	収縮期(最高)血圧	総数	837	100.0	56	100.0	108	100.0	145	100.0	119	100.0	194	100.0	215	100.0	671	100.0
		90mmHg未満	1	0.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90-99	11	1.3	3	5.4	4	3.7	3	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	0.6
		100-109	68	8.1	14	25.0	20	18.5	16	11.0	9	7.6	4	2.1	5	2.3	34	5.1
		110-119	140	16.7	17	30.4	30	27.8	31	21.4	20	16.8	21	10.8	21	9.8	93	13.9
		120-129	182	21.7	13	23.2	26	24.1	38	26.2	30	25.2	38	19.6	37	17.2	142	21.2
		130-139	184	22.0	7	12.5	11	10.2	37	25.5	24	20.2	45	23.2	60	27.9	166	24.7
		140-149	121	14.5	2	3.6	10	9.3	13	9.0	23	19.3	39	20.1	34	15.8	109	16.2
		150-159	72	8.6	0	0.0	4	3.7	4	2.8	10	8.4	28	14.4	26	12.1	68	10.1
		160-169	34	4.1	0	0.0	1	0.9	3	2.1	1	0.8	7	3.6	22	10.2	32	4.8
	170-179	10	1.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.7	1	0.5	6	2.8	9	1.3	
	180mmHg以上	14	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	5.7	3	1.4	14	2.1	
	拡張期(最低)血圧	総数	837	100.0	56	100.0	108	100.0	145	100.0	119	100.0	194	100.0	215	100.0	671	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.3
		50-59	11	1.3	1	1.8	3	2.8	1	0.7	2	1.7	2	1.0	2	0.9	7	1.0
		60-69	81	9.7	16	28.6	13	12.0	9	6.2	3	2.5	10	5.2	30	14.0	51	7.6
		70-79	235	28.1	21	37.5	39	36.1	36	24.8	29	24.4	44	22.7	66	30.7	175	26.1
		80-89	292	34.9	17	30.4	36	33.3	55	37.9	48	40.3	71	36.6	65	30.2	238	35.5
90-99		147	17.6	1	1.8	11	10.2	32	22.1	23	19.3	46	23.7	34	15.8	135	20.1	
100-109		56	6.7	0	0.0	4	3.7	11	7.6	11	9.2	16	8.2	14	6.5	52	7.7	
110-119		11	1.3	0	0.0	1	0.9	1	0.7	3	2.5	4	2.1	2	0.9	10	1.5	
120-129	2	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.1		
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
女	収縮期(最高)血圧	総数	1,361	100.0	84	100.0	198	100.0	238	100.0	260	100.0	308	100.0	273	100.0	1,074	100.0
		90mmHg未満	5	0.4	0	0.0	4	2.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
		90-99	63	4.6	13	15.5	26	13.1	16	6.7	2	0.8	5	1.6	1	0.4	24	2.2
		100-109	256	18.8	32	38.1	76	38.4	63	26.5	43	16.5	26	8.4	16	5.9	147	13.7
		110-119	292	21.5	27	32.1	55	27.8	76	31.9	52	20.0	54	17.5	28	10.3	209	19.5
		120-129	284	20.9	10	11.9	26	13.1	45	18.9	71	27.3	74	24.0	58	21.2	248	23.1
		130-139	202	14.8	1	1.2	9	4.5	21	8.8	42	16.2	66	21.4	63	23.1	190	17.7
		140-149	135	9.9	0	0.0	1	0.5	11	4.6	27	10.4	45	14.6	51	18.7	133	12.4
		150-159	58	4.3	0	0.0	0	0.0	3	1.3	12	4.6	14	4.5	29	10.6	58	5.4
		160-169	37	2.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	5	1.9	18	5.8	13	4.8	36	3.4
	170-179	18	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.5	4	1.3	9	3.3	18	1.7	
	180mmHg以上	11	0.8	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.8	2	0.6	5	1.8	10	0.9	
	拡張期(最低)血圧	総数	1,361	100.0	84	100.0	198	100.0	238	100.0	260	100.0	308	100.0	273	100.0	1,074	100.0
		40mmHg未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-59	56	4.1	12	14.3	15	7.6	9	3.8	5	1.9	2	0.6	13	4.8	28	2.6
		60-69	301	22.1	34	40.5	84	42.4	61	25.6	44	16.9	37	12.0	41	15.0	182	16.9
		70-79	484	35.6	28	33.3	70	35.4	107	45.0	74	28.5	115	37.3	90	33.0	386	35.9
		80-89	364	26.7	8	9.5	24	12.1	50	21.0	92	35.4	106	34.4	84	30.8	331	30.8
90-99		115	8.4	1	1.2	3	1.5	6	2.5	33	12.7	37	12.0	35	12.8	109	10.1	
100-109		25	1.8	0	0.0	0	0.0	3	1.3	8	3.1	8	2.6	6	2.2	25	2.3	
110-119		14	1.0	1	1.2	1	0.5	2	0.8	3	1.2	3	1.0	4	1.5	12	1.1	
120-129	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1		
130-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

第23表の4 収縮期（最高）・拡張期（最低）血圧の平均値及び標準偏差－年齢階級別、人数、平均値、標準偏差－男性・女性、20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

(mmHg)

		総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-89歳		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	収縮期(最高)血圧	837	131.7	18.0	56	116.8	11.2	108	120.9	15.6	145	125.5	13.7	119	131.2	14.8	194	138.9	17.8	215	138.9	18.3	671	134.6	17.5
	拡張期(最低)血圧	837	82.8	11.5	56	74.1	8.3	108	79.6	11.6	145	83.9	10.1	119	85.8	11.0	194	86.0	11.1	215	81.2	12.1	671	84.0	11.3
女性	収縮期(最高)血圧	1,361	124.0	18.6	84	109.5	11.4	198	110.2	12.6	238	116.3	14.4	260	125.9	17.3	308	130.4	17.2	273	136.2	18.0	1,074	127.7	18.3
	拡張期(最低)血圧	1,361	76.8	11.0	84	69.1	9.9	198	70.4	9.6	238	74.7	9.8	260	80.0	11.3	308	79.9	9.6	273	79.0	11.1	1,074	78.5	10.6

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)
 注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

第24表の1 血色素量の分布－血色素量の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1200	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	301	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
総数	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	5	1.1	2	0.6	4	1.5
10.0g/dL未満	15	1.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	12	2.7	2	0.6	11	4.0
10.0-10.9	18	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	15	3.4	6	1.7	12	4.4
11.0-11.9	70	5.8	0	0.0	2	2.0	0	0.0	4	2.5	10	3.3	54	12.3	18	5.2	45	16.4
12.0-12.9	176	14.7	1	2.0	4	3.9	7	4.8	18	11.2	48	15.9	98	22.3	61	17.5	70	25.5
13.0-13.9	355	29.6	13	25.5	27	26.5	40	27.4	51	31.7	93	30.9	131	29.8	123	35.2	68	24.8
14.0-14.9	344	28.7	24	47.1	41	40.2	68	46.6	49	30.4	85	28.2	77	17.5	80	22.9	44	16.1
15.0-15.9	166	13.8	9	17.6	23	22.5	20	13.7	29	18.0	49	16.3	36	8.2	47	13.5	16	5.8
16.0-16.9	43	3.6	4	7.8	3	2.9	10	6.8	9	5.6	9	3.0	8	1.8	8	2.3	3	1.1
17.0-17.9	6	0.5	0	0.0	1	1.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	3	0.7	2	0.6	1	0.4
18.0g/dL以上	1731	100.0	82	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	558	100.0	457	100.0	337	100.0
女性	28	1.6	0	0.0	6	3.2	12	5.2	2	0.7	1	0.3	7	1.3	1	0.2	7	2.1
10.0g/dL未満	35	2.0	1	1.2	6	3.2	12	5.2	3	1.1	2	0.5	11	2.0	2	0.4	10	3.0
10.0-10.9	179	10.3	11	13.4	26	13.8	28	12.2	21	7.7	25	6.3	68	12.2	36	7.9	47	13.9
11.0-11.9	434	25.1	20	24.4	55	29.3	65	28.4	58	21.2	91	22.8	145	26.0	103	22.5	99	29.4
12.0-12.9	671	38.8	32	39.0	76	40.4	80	34.9	109	39.8	170	42.5	204	36.6	197	43.1	110	32.6
13.0-13.9	306	17.7	17	20.7	17	9.0	28	12.2	62	22.6	83	20.8	99	17.7	99	21.7	48	14.2
14.0-14.9	68	3.9	1	1.2	2	1.1	3	1.3	17	6.2	23	5.8	22	3.9	16	3.5	15	4.5
15.0-15.9	8	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	4	1.0	1	0.2	3	0.7	0	0.0
16.0-16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
17.0-17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
18.0g/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 血色素量の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第24表の2 血色素量の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1200	14.8	1.4	51	15.6	0.9	102	15.3	1.1	146	15.4	1.0	161	15.1	1.1	301	14.8	1.3	439	14.1	1.6	349	14.7	1.3	274	13.8	1.6
女性	1731	13.1	1.2	82	13.2	1.0	188	12.8	1.2	229	12.7	1.4	274	13.4	1.1	400	13.5	1.0	558	13.1	1.2	457	13.4	1.0	337	12.9	1.2

注) 血色素量の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第24表の3 血色素量の分布－血色素量の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1188	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	160	100.0	299	100.0	430	100.0	346	100.0	266	100.0
総数	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	5	1.2	2	0.6	4	1.5
10.0g/dL未満	14	1.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	11	2.6	2	0.6	10	3.8
10.0-10.9	16	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	13	3.0	6	1.7	10	3.8
11.0-11.9	64	5.4	0	0.0	2	2.0	0	0.0	3	1.9	9	3.0	50	11.6	16	4.6	42	15.8
12.0-12.9	174	14.6	1	2.0	4	3.9	7	4.8	18	11.3	48	16.1	96	22.3	61	17.6	68	25.6
13.0-13.9	354	29.8	13	25.5	27	26.5	40	27.4	51	31.9	92	30.8	131	30.5	122	35.3	68	25.6
14.0-14.9	344	29.0	24	47.1	41	40.2	68	46.6	49	30.6	85	28.4	77	17.9	80	23.1	44	16.5
15.0-15.9	166	14.0	9	17.6	23	22.5	20	13.7	29	18.1	49	16.4	36	8.4	47	13.6	16	6.0
16.0-16.9	43	3.6	4	7.8	3	2.9	10	6.8	9	5.6	9	3.0	8	1.9	8	2.3	3	1.1
17.0-17.9	6	0.5	0	0.0	1	1.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	3	0.7	2	0.6	1	0.4
18.0g/dL以上	1695	100.0	81	100.0	184	100.0	220	100.0	269	100.0	398	100.0	543	100.0	451	100.0	327	100.0
女性	24	1.4	0	0.0	5	2.7	12	5.5	1	0.4	1	0.3	5	0.9	1	0.2	5	1.5
10.0g/dL未満	34	2.0	1	1.2	5	2.7	12	5.5	3	1.1	2	0.5	11	2.0	2	0.4	10	3.1
10.0-10.9	169	10.0	11	13.6	25	13.6	25	11.4	19	7.1	25	6.3	64	11.8	35	7.8	44	13.5
11.0-11.9	426	25.1	20	24.7	55	29.9	62	28.2	56	20.8	91	22.9	142	26.2	102	22.6	97	29.7
12.0-12.9	664	39.2	31	38.3	75	40.8	78	35.5	109	40.5	169	42.5	202	37.2	195	43.2	110	33.6
13.0-13.9	302	17.8	17	21.0	17	9.2	28	12.7	62	23.0	82	20.6	96	17.7	97	21.5	46	14.1
14.0-14.9	66	3.9	1	1.2	2	1.1	2	0.9	17	6.3	23	5.8	21	3.9	16	3.5	14	4.3
15.0-15.9	8	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.7	4	1.0	1	0.2	3	0.7	0	0.0
16.0-16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
17.0-17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
18.0g/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 血色素量の測定を行い，身体状況調査の問診において貧血治療のための薬（鉄剤）の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第24表の4 血色素量の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1188	14.8	1.4	51	15.6	0.9	102	15.3	1.1	146	15.4	1.0	160	15.2	1.1	299	14.9	1.3	430	14.2	1.6	346	14.7	1.3	266	13.8	1.6
女性	1695	13.2	1.2	81	13.2	1.0	184	12.8	1.2	220	12.7	1.4	269	13.4	1.1	398	13.5	1.0	543	13.1	1.1	451	13.4	1.0	327	13.0	1.2

注) 血色素量の測定を行い，身体状況調査の問診において貧血治療のための薬（鉄剤）の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第25表の1 赤血球数の分布—赤血球数の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
男性	総数	1,200	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	301	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
	400万個/mm ³ 未満	97	8.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	4	2.5	22	7.3	70	15.9	27	7.7	58	21.2
	400-449	285	23.8	1	2.0	8	7.8	11	7.5	34	21.1	74	24.6	157	35.8	104	29.8	104	38.0
	450-499	503	41.9	18	35.3	41	40.2	74	50.7	79	49.1	138	45.8	153	34.9	155	44.4	83	30.3
	500-549	267	22.3	26	51.0	44	43.1	50	34.2	37	23.0	60	19.9	50	11.4	52	14.9	27	9.9
	550-599	44	3.7	6	11.8	8	7.8	10	6.8	6	3.7	7	2.3	7	1.6	9	2.6	2	0.7
	600-649	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,731	100.0	82	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	558	100.0	457	100.0	337	100.0
	400万個/mm ³ 未満	263	15.2	5	6.1	23	12.2	31	13.5	24	8.8	35	8.8	145	26.0	57	12.5	110	32.6
	400-449	887	51.2	35	42.7	104	55.3	122	53.3	136	49.6	218	54.5	272	48.7	247	54.0	158	46.9
	450-499	511	29.5	38	46.3	58	30.9	72	31.4	97	35.4	125	31.3	121	21.7	136	29.8	58	17.2
	500-549	65	3.8	4	4.9	3	1.6	4	1.7	14	5.1	21	5.3	19	3.4	16	3.5	11	3.3
	550-599	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	600-649	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	650万個/mm ³ 以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第25表の2 赤血球数の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,200	469.2	48.5	51	512.5	32.2	102	499.6	41.4	146	495.0	33.6	161	477.3	39.7	301	467.4	44.8	439	446.8	49.1	349	463.2	45.1	274	437.6	48.9
女性	1,731	435.2	37.6	82	450.9	30.7	188	435.9	32.3	229	435.6	31.7	274	444.3	39.3	400	440.1	34.7	558	424.4	40.8	457	436.0	35.7	337	418.1	41.5

注) 赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第26表の1 ヘマトクリット値の分布—ヘマトクリット値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
男性	総数	1,200	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	301	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
	25.0%未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	25.0-29.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.4
	30.0-34.9	22	1.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	19	4.3	3	0.9	17	6.2
	35.0-39.9	120	10.0	1	2.0	3	2.9	2	1.4	6	3.7	24	8.0	84	19.1	37	10.6	66	24.1
	40.0-44.9	548	45.7	20	39.2	47	46.1	63	43.2	75	46.6	138	45.8	205	46.7	166	47.6	124	45.3
	45.0-49.9	451	37.6	28	54.9	47	46.1	71	48.6	70	43.5	126	41.9	109	24.8	127	36.4	55	20.1
	50.0-54.9	52	4.3	2	3.9	4	3.9	9	6.2	10	6.2	8	2.7	19	4.3	14	4.0	10	3.6
	55.0%以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	(再掲)39.8未満	141	11.8	1	2.0	4	3.9	2	1.4	5	3.1	27	9.0	102	23.2	39	11.2	83	30.3
	(再掲)51.9以上	22	1.8	2	3.9	1	1.0	4	2.7	3	1.9	4	1.3	8	1.8	6	1.7	4	1.5
女性	総数	1,731	100.0	82	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	558	100.0	457	100.0	337	100.0
	25.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	25.0-29.9	9	0.5	0	0.0	0	0.0	4	1.7	1	0.4	0	0.0	4	0.7	0	0.0	4	1.2
	30.0-34.9	83	4.8	2	2.4	17	9.0	22	9.6	10	3.6	6	1.5	26	4.7	9	2.0	22	6.5
	35.0-39.9	726	41.9	36	43.9	99	52.7	114	49.8	96	35.0	137	34.3	244	43.7	166	36.3	158	46.9
	40.0-44.9	809	46.7	43	52.4	69	36.7	81	35.4	145	52.9	226	56.5	245	43.9	256	56.0	128	38.0
	45.0-49.9	99	5.7	1	1.2	2	1.1	7	3.1	22	8.0	29	7.3	38	6.8	26	5.7	24	7.1
	50.0-54.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)33.4未満	48	2.8	1	1.2	10	5.3	14	6.1	4	1.5	4	1.0	15	2.7	3	0.7	15	4.5
	(再掲)45.0以上	103	6.0	1	1.2	2	1.1	8	3.5	22	8.0	31	7.8	39	7.0	26	5.7	25	7.4

注) ヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第26表の2 ヘマトクリット値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,200	44.0	3.9	51	45.7	2.6	102	45.2	3.1	146	45.5	2.7	161	45.0	3.0	301	44.2	3.6	439	42.6	4.4	349	43.9	3.7	274	41.8	4.5
女性	1,731	40.1	3.3	82	40.0	2.3	188	38.9	3.1	229	38.9	3.5	274	40.7	3.1	400	41.0	2.9	558	40.0	3.4	457	40.8	2.8	337	39.6	3.7

注) ヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第27表の1 平均赤血球容積 (MCV) の分布—平均赤血球容積の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,200	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	301	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
女性	1,731	100.0	82	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	558	100.0	457	100.0	337	100.0
70歳未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
70-75未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75-80未満	7	0.6	1	2.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	2	0.5	3	0.9	2	0.7
80-85未満	27	2.3	1	2.0	8	7.8	4	2.7	2	1.2	3	1.0	9	2.1	6	1.7	5	1.8
85-90未満	213	17.8	31	60.8	39	38.2	41	28.1	25	15.5	37	12.3	40	9.1	40	11.5	23	8.4
90-95未満	470	39.2	15	29.4	40	39.2	73	50.0	61	37.9	126	41.9	155	35.3	129	37.0	96	35.0
95-100未満	338	28.2	3	5.9	12	11.8	22	15.1	55	34.2	90	29.9	156	35.5	119	34.1	96	35.0
100-105未満	104	8.7	0	0.0	1	1.0	5	3.4	15	9.3	28	9.3	55	12.5	37	10.6	36	13.1
105-110未満	32	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.9	11	3.7	17	3.9	13	3.7	12	4.4
110-115未満	5	0.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	1	0.3	2	0.7
115-120未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.2	1	0.3	1	0.4
120歳以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 赤血球数及びヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第27表の2 平均赤血球容積 (MCV) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,200	94.1	5.4	51	89.3	3.4	102	90.6	4.2	146	92.0	4.1	161	94.4	4.6	301	94.9	5.4	439	95.5	5.6	349	95.1	5.3	274	95.7	5.9
女性	1,731	92.3	5.7	82	88.9	4.3	188	89.5	5.8	229	89.5	7.4	274	91.8	5.9	400	93.3	4.3	558	94.5	4.7	457	93.7	4.5	337	94.8	4.7

注) 赤血球数及びヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第28表の1 平均赤血球色素量 (MCH) の分布—平均赤血球色素量の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,200	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	301	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
女性	1,731	100.0	82	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	558	100.0	457	100.0	337	100.0
20pg未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
20-25未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.7	2	0.6	3	1.1
25-27未満	11	0.9	1	2.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	0.7	6	1.4	5	1.4	3	1.1
27-29未満	54	4.5	3	5.9	9	8.8	5	3.4	6	3.7	9	3.0	22	5.0	17	4.9	12	4.4
29-31未満	375	31.3	33	64.7	52	51.0	60	41.1	35	21.7	89	29.6	106	24.1	95	27.2	71	25.9
31-33未満	537	44.8	14	27.5	34	33.3	67	45.9	89	55.3	129	42.9	204	46.5	150	43.0	125	45.6
33-35未満	188	15.7	0	0.0	6	5.9	12	8.2	27	16.8	55	18.3	88	20.0	67	19.2	53	19.3
35-40未満	27	2.3	0	0.0	1	1.0	1	0.7	3	1.9	14	4.7	8	1.8	12	3.4	5	1.8
40pg以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.4

注) 色素量及び赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第28表の2 平均赤血球色素量 (MCH) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,200	31.5	1.9	51	30.4	1.2	102	30.8	1.4	146	31.2	1.4	161	31.8	1.5	301	31.9	2.0	439	31.6	2.1	349	31.7	2.0	274	31.6	2.2
女性	1,731	30.3	2.2	82	29.3	1.9	188	29.4	2.4	229	29.2	3.1	274	30.2	2.3	400	30.6	1.5	558	30.9	1.6	457	30.7	1.5	337	31.0	1.7

注) 色素量及び赤血球数の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第29表の1 平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の分布—平均赤血球血色素濃度の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,200	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	301	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
総数	1,200	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	301	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-26未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26-28未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
28-30未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	1	0.3	3	1.1
30-32未満	94	7.8	1	2.0	0	0.0	4	2.7	6	3.7	16	5.3	67	15.3	33	9.5	47	17.2
32-34未満	685	57.1	23	45.1	52	51.0	71	48.6	96	59.6	177	58.8	266	60.6	215	61.6	166	60.6
34%以上	416	34.7	27	52.9	50	49.0	71	48.6	59	36.6	107	35.5	102	23.2	100	28.7	57	20.8
女性	1,731	100.0	82	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	558	100.0	457	100.0	337	100.0
総数	1,731	100.0	82	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	558	100.0	457	100.0	337	100.0
22%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22-24未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24-26未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26-28未満	3	0.2	0	0.0	2	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28-30未満	23	1.3	1	1.2	4	2.1	6	2.6	5	1.8	2	0.5	5	0.9	1	0.2	4	1.2
30-32未満	329	19.0	14	17.1	28	14.9	56	24.5	37	13.5	73	18.3	121	21.7	98	21.4	71	21.1
32-34未満	1,189	68.7	54	65.9	124	66.0	141	61.6	198	72.3	286	71.5	386	69.2	316	69.1	238	70.6
34%以上	185	10.7	13	15.9	30	16.0	24	10.5	33	12.0	39	9.8	46	8.2	42	9.2	24	7.1

注) 血色素量及びヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第29表の2 平均赤血球血色素濃度 (MCHC) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,200	33.5	1.1	51	34.1	1.0	102	34.0	0.8	146	33.9	1.0	161	33.7	0.9	301	33.6	1.0	439	33.1	1.2	349	33.4	1.0	274	33.0	1.2
女性	1,731	32.8	1.1	82	32.9	1.1	188	32.8	1.2	229	32.6	1.4	274	32.9	1.2	400	32.8	1.0	558	32.7	1.0	457	32.8	1.0	337	32.7	1.0

注) 血色素量及びヘマトクリット値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第30表の1 血清総たんぱく質値の分布—血清総たんぱく質値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	154	100.0	120	100.0
総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	154	100.0	120	100.0
6.0g/dl未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.0-6.4	10	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	0.7	6	1.4	5	1.4	1	0.6	1	0.8
6.5-6.9	185	15.4	1	1.9	11	10.7	15	10.3	23	14.4	42	13.9	93	21.1	63	18.0	34	22.1	25	20.8
7.0-7.4	535	44.5	13	25.0	39	37.9	59	40.4	90	56.3	144	47.7	190	43.2	156	44.6	71	46.1	54	45.0
7.5-7.9	387	32.2	26	50.0	46	44.7	60	41.1	36	22.5	96	31.8	123	28.0	104	29.7	38	24.7	35	29.2
8.0-8.4	79	6.6	12	23.1	6	5.8	11	7.5	8	5.0	16	5.3	26	5.9	21	6.0	9	5.8	5	4.2
8.5g/dl以上	6	0.5	0	0.0	1	1.0	1	0.7	0	0.0	2	0.7	2	0.5	1	0.3	1	0.6	0	0.0
(再掲)6.5未満	11	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	2	0.7	6	1.4	5	1.4	1	0.6	1	0.8
女性	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	160	100.0	185	100.0
総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	160	100.0	185	100.0
6.0g/dl未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
6.0-6.4	23	1.3	2	2.4	3	1.6	5	2.2	1	0.4	1	0.3	11	1.9	4	0.9	2	1.3	6	3.2
6.5-6.9	263	15.1	5	6.0	24	12.8	38	16.5	40	14.5	50	12.5	106	18.7	72	15.8	30	18.8	34	18.4
7.0-7.4	717	41.2	25	30.1	73	38.8	112	48.7	107	38.9	185	46.4	215	37.9	215	47.0	65	40.6	54	29.2
7.5-7.9	599	34.4	42	50.6	67	35.6	65	28.3	99	36.0	139	34.8	187	33.0	146	31.9	50	31.3	68	36.8
8.0-8.4	123	7.1	9	10.8	19	10.1	9	3.9	24	8.7	20	5.0	42	7.4	17	3.7	11	6.9	20	10.8
8.5g/dl以上	16	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.4	4	1.5	4	1.0	6	1.1	3	0.7	2	1.3	3	1.6
(再掲)6.5未満	24	1.4	2	2.4	4	2.1	5	2.2	1	0.4	1	0.3	11	1.9	4	0.9	2	1.3	6	3.2

注) 血清総たんぱく質値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第30表の2 血清総たんぱく質値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	7.3	0.4	52	7.6	0.3	103	7.5	0.4	146	7.4	0.4	160	7.3	0.4	302	7.3	0.4	440	7.3	0.4	350	7.3	0.4	154	7.3	0.4	120	7.3	0.4
女性	1,742	7.4	0.4	83	7.5	0.4	188	7.4	0.4	230	7.3	0.4	275	7.4	0.4	399	7.4	0.4	567	7.3	0.4	457	7.3	0.4	160	7.3	0.4	185	7.4	0.5

注) 血清総たんぱく質値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第31表の1 血清アルブミン値の分布—血清アルブミン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—
男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75-79歳		(再掲) 80歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	154	100.0	120	100.0
	3.0g/dl未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.7
	3.4-3.5	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	4	0.9	4	1.1	0	0.0	2	1.7
	3.6-3.7	23	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.9	3	1.0	16	3.6	7	2.0	6	3.9	5	4.2
	3.8-3.9	49	4.1	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	1.3	14	4.6	31	7.0	15	4.3	12	7.8	15	12.5
	4.0-4.1	121	10.1	0	0.0	1	1.0	2	1.4	8	5.0	27	8.9	83	18.9	41	11.7	31	20.1	32	26.7
	4.2-4.3	233	19.4	0	0.0	3	2.9	17	11.6	24	15.0	76	25.2	113	25.7	95	27.1	37	24.0	29	24.2
	4.4-4.5	256	21.3	0	0.0	16	15.5	25	17.1	37	23.1	69	22.8	109	24.8	93	26.6	34	22.1	25	20.8
	4.6-4.7	255	21.2	13	25.0	31	30.1	39	26.7	51	31.9	72	23.8	49	11.1	57	16.3	22	14.3	8	6.7
	4.8-4.9	159	13.2	13	25.0	31	30.1	39	26.7	21	13.1	31	10.3	24	5.5	26	7.4	10	6.5	2	1.7
	5.0-5.1	68	5.7	15	28.8	14	13.6	15	10.3	11	6.9	6	2.0	7	1.6	10	2.9	1	0.6	0	0.0
	5.2g/dl以上	30	2.5	11	21.2	5	4.9	8	5.5	3	1.9	1	0.3	2	0.5	1	0.3	1	0.6	0	0.0
	(再掲)3.5以下	9	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	6	1.4	5	1.4	0	0.0	4	3.3
女性	総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	160	100.0	185	100.0
	3.0g/dl未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3.0-3.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	3.2-3.3	5	0.3	1	1.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.1
	3.4-3.5	8	0.5	0	0.0	4	2.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	0.5	0	0.0	1	0.6	2	1.1
	3.6-3.7	18	1.0	2	2.4	3	1.6	1	0.4	0	0.0	3	0.8	9	1.6	3	0.7	1	0.6	7	3.8
	3.8-3.9	59	3.4	1	1.2	1	0.5	6	2.6	4	1.5	13	3.3	34	6.0	18	3.9	10	6.3	16	8.6
	4.0-4.1	192	11.0	0	0.0	12	6.4	29	12.6	20	7.3	34	8.5	97	17.1	50	10.9	30	18.8	39	21.1
	4.2-4.3	393	22.6	8	9.6	19	10.1	57	24.8	51	18.5	108	27.1	150	26.5	127	27.8	44	27.5	48	25.9
	4.4-4.5	547	31.4	20	24.1	58	30.9	86	37.4	100	36.4	115	28.8	168	29.6	151	33.0	47	29.4	45	24.3
	4.6-4.7	317	18.2	23	27.7	51	27.1	38	16.5	57	20.7	82	20.6	66	11.6	73	16.0	19	11.9	16	8.6
	4.8-4.9	156	9.0	23	27.7	26	13.8	10	4.3	33	12.0	32	8.0	32	5.6	29	6.3	7	4.4	9	4.9
	5.0-5.1	37	2.1	4	4.8	9	4.8	3	1.3	7	2.5	10	2.5	4	0.7	4	0.9	0	0.0	1	0.5
	5.2g/dl以上	8	0.5	1	1.2	2	1.1	0	0.0	2	0.7	2	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.6	0	0.0
	(再掲)3.5以下	15	0.9	1	1.2	7	3.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	6	1.1	1	0.2	1	0.6	4	2.2

注) 血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第31表の2 血清アルブミン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—
男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75-79歳			(再掲) 80歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	4.5	0.4	52	5.0	0.2	103	4.7	0.3	146	4.7	0.3	160	4.6	0.3	302	4.4	0.3	440	4.3	0.3	350	4.4	0.3	154	4.3	0.3	120	4.2	0.3
女性	1,742	4.4	0.3	83	4.6	0.3	188	4.5	0.4	230	4.4	0.2	275	4.5	0.3	399	4.4	0.3	567	4.3	0.3	457	4.4	0.3	160	4.3	0.3	185	4.2	0.3

注) 血清アルブミン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第 32 表の 1 ヘモグロビン A1c (NGSP) の分布—ヘモグロビン A1c (NGSP) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用を含む〕

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	2,934	100.0	132	100.0	290	100.0	375	100.0	435	100.0	702	100.0	1,000	100.0	807	100.0	613	100.0
4.2%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
4.3-4.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	13	0.4	1	0.8	4	1.4	2	0.5	3	0.7	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.3
4.7-4.8	23	0.8	1	0.8	10	3.4	4	1.1	2	0.5	1	0.1	5	0.5	1	0.1	4	0.7
4.9-5.0	83	2.8	19	14.4	25	8.6	12	3.2	10	2.3	8	1.1	9	0.9	5	0.6	4	0.7
5.1-5.2	242	8.2	30	22.7	66	22.8	47	12.5	35	8.0	27	3.8	37	3.7	28	3.5	26	4.2
5.3	215	7.3	17	12.9	40	13.8	47	12.5	29	6.7	35	5.0	47	4.7	36	4.5	32	5.2
5.4	236	8.0	17	12.9	32	11.0	49	13.1	42	9.7	40	5.7	56	5.6	46	5.7	34	5.5
5.5	319	10.9	20	15.2	34	11.7	51	13.6	47	10.8	70	10.0	97	9.7	78	9.7	63	10.3
5.6	253	8.6	10	7.6	25	8.6	37	9.9	55	12.6	61	8.7	65	6.5	61	7.6	39	6.4
5.7	287	9.8	6	4.5	22	7.6	40	10.7	47	10.8	85	12.1	87	8.7	72	8.9	58	9.5
5.8	236	8.0	3	2.3	10	3.4	27	7.2	33	7.6	69	9.8	94	9.4	78	9.7	57	9.3
5.9	195	6.6	6	4.5	8	2.8	18	4.8	32	7.4	56	8.0	75	7.5	69	8.6	44	7.2
6.0	166	5.7	1	0.8	4	1.4	7	1.9	29	6.7	47	6.7	78	7.8	64	7.9	39	6.4
6.1	138	4.7	0	0.0	4	1.4	10	2.7	17	3.9	42	6.0	65	6.5	54	6.7	39	6.4
6.2	93	3.2	1	0.8	2	0.7	4	1.1	10	2.3	26	3.7	50	5.0	42	5.2	26	4.2
6.3	76	2.6	0	0.0	1	0.3	2	0.5	7	1.6	21	3.0	45	4.5	28	3.5	28	4.6
6.4	54	1.8	0	0.0	0	0.0	3	0.8	5	1.1	9	1.3	37	3.7	23	2.9	20	3.3
6.5	46	1.6	0	0.0	1	0.3	3	0.8	6	1.4	12	1.7	24	2.4	14	1.7	17	2.8
6.6-6.7	68	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	6	1.4	21	3.0	40	4.0	30	3.7	27	4.4
6.8-6.9	45	1.5	0	0.0	1	0.3	4	1.1	3	0.7	20	2.8	17	1.7	17	2.1	12	2.0
7.0-7.1	22	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.5	5	1.1	6	0.9	9	0.9	9	1.1	5	0.8
7.2-7.3	28	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	8	1.1	16	1.6	9	1.1	9	1.5
7.4-7.5	25	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	7	1.0	15	1.5	11	1.4	8	1.3
7.6-7.7	18	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	5	0.7	11	1.1	9	1.1	7	1.1
7.8-7.9	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.6	5	0.5	3	0.4	5	0.8
8.0-8.1	7	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	2	0.3	2	0.2	4	0.5	0	0.0
8.2-8.3	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.7	4	0.4	2	0.2	4	0.7
8.4-8.5	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.4	0	0.0	2	0.2	0	0.0
8.6-8.7	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	3	0.3	3	0.4	1	0.2
8.8-8.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0
9.4以上	12	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	6	0.9	4	0.4	6	0.7	2	0.3
男	1,201	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	302	100.0	439	100.0	349	100.0	274	100.0
4.2%以下	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
4.3-4.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	6	0.5	1	2.0	2	2.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.4
4.7-4.8	10	0.8	0	0.0	6	5.9	2	1.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.4
4.9-5.0	34	2.8	8	15.7	11	10.8	2	1.4	4	2.5	4	1.3	5	1.1	2	0.6	3	1.1
5.1-5.2	104	8.7	15	29.4	20	19.6	20	13.7	11	6.8	18	6.0	20	4.6	18	5.2	13	4.7
5.3	100	8.3	8	15.7	17	16.7	25	17.1	12	7.5	15	5.0	23	5.2	14	4.0	16	5.8
5.4	98	8.2	6	11.8	13	12.7	15	10.3	19	11.8	19	6.3	26	5.9	26	7.4	13	4.7
5.5	116	9.7	6	11.8	11	10.8	17	11.6	16	9.9	24	7.9	42	9.6	23	6.6	29	10.6
5.6	90	7.5	2	3.9	6	5.9	11	7.5	14	8.7	26	8.6	31	7.1	27	7.7	21	7.7
5.7	106	8.8	3	5.9	8	7.8	16	11.0	18	11.2	30	9.9	31	7.1	24	6.9	23	8.4
5.8	85	7.1	0	0.0	2	2.0	12	8.2	9	5.6	28	9.3	34	7.7	28	8.0	20	7.3
5.9	64	5.3	2	3.9	1	1.0	7	4.8	8	5.0	20	6.6	26	5.9	28	8.0	15	5.5
6.0	56	4.7	0	0.0	2	2.0	2	1.4	10	6.2	17	5.6	25	5.7	22	6.3	13	4.7
6.1	53	4.4	0	0.0	1	1.0	3	2.1	5	3.1	13	4.3	31	7.1	17	4.9	22	8.0
6.2	36	3.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	5	3.1	9	3.0	19	4.3	14	4.0	10	3.6
6.3	38	3.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	5	3.1	10	3.3	22	5.0	17	4.9	13	4.7
6.4	23	1.9	0	0.0	0	0.0	3	2.1	1	0.6	4	1.3	15	3.4	10	2.9	8	2.9
6.5	23	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.5	6	2.0	13	3.0	8	2.3	8	2.9
6.6-6.7	35	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	11	3.6	21	4.8	18	5.2	13	4.7
6.8-6.9	29	2.4	0	0.0	1	1.0	3	2.1	3	1.9	14	4.6	8	1.8	11	3.2	6	2.2
7.0-7.1	13	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	5	3.1	3	1.0	4	0.9	3	0.9	3	1.1
7.2-7.3	17	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	3	1.0	11	2.5	6	1.7	6	2.2
7.4-7.5	14	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	5	1.7	8	1.8	7	2.0	4	1.5
7.6-7.7	12	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	3	1.0	7	1.6	6	1.7	4	1.5
7.8-7.9	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.7	2	0.6	3	1.1
8.0-8.1	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	0.7	2	0.5	4	1.1	0	0.0
8.2-8.3	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	4	0.9	1	0.3	4	1.5
8.4-8.5	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0
8.6-8.7	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	3	0.9	0	0.0
8.8-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.6	0	0.0
9.4以上	9	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	5	1.7	2	0.5	4	1.1	1	0.4
女	1,733	100.0	81	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	561	100.0	458	100.0	339	100.0
4.2%以下	1	0.1	0	0														

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
総数	1,733	100.0	81	100.0	188	100.0	229	100.0	274	100.0	400	100.0	561	100.0	458	100.0	339	100.0	
女性	4.2%以下	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	7	0.4	0	0.0	2	1.1	2	0.9	2	0.7	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	4.7-4.8	13	0.8	1	1.2	4	2.1	2	0.9	2	0.7	1	0.3	3	0.5	0	0.0	3	0.9
	4.9-5.0	49	2.8	11	13.6	14	7.4	10	4.4	6	2.2	4	1.0	4	0.7	3	0.7	1	0.3
	5.1-5.2	138	8.0	15	18.5	46	24.5	27	11.8	24	8.8	9	2.3	17	3.0	10	2.2	13	3.8
	5.3	115	6.6	9	11.1	23	12.2	22	9.6	17	6.2	20	5.0	24	4.3	22	4.8	16	4.7
	5.4	138	8.0	11	13.6	19	10.1	34	14.8	23	8.4	21	5.3	30	5.3	20	4.4	21	6.2
	5.5	203	11.7	14	17.3	23	12.2	34	14.8	31	11.3	46	11.5	55	9.8	55	12.0	34	10.0
	5.6	163	9.4	8	9.9	19	10.1	26	11.4	41	15.0	35	8.8	34	6.1	34	7.4	18	5.3
	5.7	181	10.4	3	3.7	14	7.4	24	10.5	29	10.6	55	13.8	56	10.0	48	10.5	35	10.3
	5.8	151	8.7	3	3.7	8	4.3	15	6.6	24	8.8	41	10.3	60	10.7	50	10.9	37	10.9
	5.9	131	7.6	4	4.9	7	3.7	11	4.8	24	8.8	36	9.0	49	8.7	41	9.0	29	8.6
	6.0	110	6.3	1	1.2	2	1.1	5	2.2	19	6.9	30	7.5	53	9.4	42	9.2	26	7.7
	6.1	85	4.9	0	0.0	3	1.6	7	3.1	12	4.4	29	7.3	34	6.1	37	8.1	17	5.0
	6.2	57	3.3	1	1.2	2	1.1	1	0.4	5	1.8	17	4.3	31	5.5	28	6.1	16	4.7
	6.3	38	2.2	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.7	11	2.8	23	4.1	11	2.4	15	4.4
	6.4	31	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	5	1.3	22	3.9	13	2.8	12	3.5
	6.5	23	1.3	0	0.0	1	0.5	3	1.3	2	0.7	6	1.5	11	2.0	6	1.3	9	2.7
	6.6-6.7	33	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.1	10	2.5	19	3.4	12	2.6	14	4.1
6.8-6.9	16	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	6	1.5	9	1.6	6	1.3	6	1.8	
7.0-7.1	9	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	0.8	5	0.9	6	1.3	2	0.6	
7.2-7.3	11	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	1.3	5	0.9	3	0.7	3	0.9	
7.4-7.5	11	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.5	7	1.2	4	0.9	4	1.2	
7.6-7.7	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	4	0.7	3	0.7	3	0.9	
7.8-7.9	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	2	0.4	1	0.2	2	0.6	
8.0-8.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.2-8.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	
8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
8.6-8.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.3	
8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
9.4以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.4	1	0.3	

注) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第32表の2 ヘモグロビン A1c (NGSP) の平均値及び標準偏差一年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 総数・男性・女性, 20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	2,934	5.8	0.7	132	5.3	0.3	290	5.4	0.3	375	5.6	0.4	435	5.7	0.6	702	6.0	0.8	1,000	6.0	0.6	807	6.0	0.8	613	6.0	0.6
男性	1,201	5.9	0.8	51	5.3	0.3	102	5.3	0.4	146	5.6	0.5	161	5.9	0.7	302	6.1	1.1	439	6.0	0.7	349	6.1	1.0	274	6.0	0.7
女性	1,733	5.7	0.5	81	5.4	0.3	188	5.4	0.3	229	5.5	0.4	274	5.7	0.4	400	5.9	0.5	561	5.9	0.6	458	5.9	0.5	339	5.9	0.6

注) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第 32 表の 3 ヘモグロビン A1c (NGSP) の分布—ヘモグロビン A1c (NGSP) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総 数	2,743	100.0	131	100.0	290	100.0	365	100.0	414	100.0	639	100.0	904	100.0	723	100.0	558	100.0
4.2%以下	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
4.3-4.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	13	0.5	1	0.8	4	1.4	2	0.5	3	0.7	1	0.2	2	0.2	1	0.1	2	0.4
4.7-4.8	23	0.8	1	0.8	10	3.4	4	1.1	2	0.5	1	0.2	5	0.6	1	0.1	4	0.7
4.9-5.0	83	3.0	19	14.5	25	8.6	12	3.3	10	2.4	8	1.3	9	1.0	5	0.7	4	0.7
5.1-5.2	242	8.8	30	22.9	66	22.8	47	12.9	35	8.5	27	4.2	37	4.1	28	3.9	26	4.7
5.3	214	7.8	16	12.2	40	13.8	47	12.9	29	7.0	35	5.5	47	5.2	36	5.0	32	5.7
5.4	235	8.6	17	13.0	32	11.0	49	13.4	42	10.1	40	6.3	55	6.1	45	6.2	34	6.1
5.5	318	11.6	20	15.3	34	11.7	51	14.0	47	11.4	70	11.0	96	10.6	78	10.8	62	11.1
5.6	251	9.2	10	7.6	25	8.6	36	9.9	55	13.3	60	9.4	65	7.2	60	8.3	39	7.0
5.7	283	10.3	6	4.6	22	7.6	39	10.7	47	11.4	84	13.1	85	9.4	70	9.7	57	10.2
5.8	235	8.6	3	2.3	10	3.4	27	7.4	33	8.0	69	10.8	93	10.3	78	10.8	56	10.0
5.9	191	7.0	6	4.6	8	2.8	18	4.9	32	7.7	56	8.8	71	7.9	69	9.5	40	7.2
6.0	162	5.9	1	0.8	4	1.4	7	1.9	29	7.0	47	7.4	74	8.2	63	8.7	36	6.5
6.1	131	4.8	0	0.0	4	1.4	9	2.5	17	4.1	42	6.6	59	6.5	50	6.9	37	6.6
6.2	85	3.1	1	0.8	2	0.7	3	0.8	8	1.9	22	3.4	49	5.4	38	5.3	26	4.7
6.3	67	2.4	0	0.0	1	0.3	1	0.3	6	1.4	16	2.5	43	4.8	24	3.3	27	4.8
6.4	47	1.7	0	0.0	0	0.0	3	0.8	5	1.2	5	0.8	34	3.8	19	2.6	18	3.2
6.5	36	1.3	0	0.0	1	0.3	3	0.8	6	1.4	7	1.1	19	2.1	8	1.1	15	2.7
6.6-6.7	44	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	16	2.5	24	2.7	17	2.4	19	3.4
6.8-6.9	26	0.9	0	0.0	1	0.3	3	0.8	1	0.2	13	2.0	8	0.9	9	1.2	7	1.3
7.0-7.1	12	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	3	0.5	6	0.7	5	0.7	4	0.7
7.2-7.3	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	5	0.6	3	0.4	2	0.4
7.4-7.5	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	6	0.7	4	0.6	3	0.5
7.6-7.7	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	5	0.6	3	0.4	3	0.5
7.8-7.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	1	0.1	2	0.3	1	0.2
8.0-8.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0
8.2-8.3	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.2	0	0.0	2	0.4
8.4-8.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0
8.6-8.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4以上	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.8	2	0.2	5	0.7	0	0.0
男 性	1,079	100.0	51	100.0	102	100.0	140	100.0	143	100.0	261	100.0	382	100.0	292	100.0	245	100.0
4.2%以下	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
4.3-4.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.5-4.6	6	0.6	1	2.0	2	2.0	0	0.0	1	0.7	1	0.4	1	0.3	1	0.3	1	0.4
4.7-4.8	10	0.9	0	0.0	6	5.9	2	1.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.4
4.9-5.0	34	3.2	8	15.7	11	10.8	2	1.4	4	2.8	4	1.5	5	1.3	2	0.7	3	1.2
5.1-5.2	104	9.6	15	29.4	20	19.6	20	14.3	11	7.7	18	6.9	20	5.2	18	6.2	13	5.3
5.3	100	9.3	8	15.7	17	16.7	25	17.9	12	8.4	15	5.7	23	6.0	14	4.8	16	6.5
5.4	97	9.0	6	11.8	13	12.7	15	10.7	19	13.3	19	7.3	25	6.5	25	8.6	13	5.3
5.5	115	10.7	6	11.8	11	10.8	17	12.1	16	11.2	24	9.2	41	10.7	23	7.9	28	11.4
5.6	89	8.2	2	3.9	6	5.9	11	7.9	14	9.8	25	9.6	31	8.1	26	8.9	21	8.6
5.7	103	9.5	3	5.9	8	7.8	15	10.7	18	12.6	29	11.1	30	7.9	22	7.5	23	9.4
5.8	84	7.8	0	0.0	2	2.0	12	8.6	9	6.3	28	10.7	33	8.6	28	9.6	19	7.8
5.9	61	5.7	2	3.9	1	1.0	7	5.0	8	5.6	20	7.7	23	6.0	28	9.6	12	4.9
6.0	56	5.2	0	0.0	2	2.0	2	1.4	10	7.0	17	6.5	25	6.5	22	7.5	13	5.3
6.1	49	4.5	0	0.0	1	1.0	3	2.1	5	3.5	13	5.0	27	7.1	15	5.1	20	8.2
6.2	32	3.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	3	2.1	8	3.1	19	5.0	13	4.5	10	4.1
6.3	34	3.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	4	2.8	7	2.7	22	5.8	15	5.1	13	5.3
6.4	20	1.9	0	0.0	0	0.0	3	2.1	1	0.7	3	1.1	13	3.4	8	2.7	7	2.9
6.5	18	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.8	3	1.1	11	2.9	5	1.7	8	3.3
6.6-6.7	16	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.3	10	2.6	7	2.4	8	3.3
6.8-6.9	16	1.5	0	0.0	1	1.0	3	2.1	1	0.7	7	2.7	4	1.0	5	1.7	4	1.6
7.0-7.1	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.4	3	0.8	1	0.3	3	1.2
7.2-7.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0
7.4-7.5	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	0.8	1	0.3	2	0.8
7.6-7.7	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.4	5	1.3	3	1.0	3	1.2
7.8-7.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.3	2	0.7	1	0.4
8.0-8.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0
8.2-8.3	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	0	0.0	2	0.8
8.4-8.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0
8.6-8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.4以上	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.9	1	0.3	4	1.4	0	0.0

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
女性	総数	1,664	100.0	80	100.0	188	100.0	225	100.0	271	100.0	378	100.0	522	100.0	431	100.0	313	100.0
	4.2%以下	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.3-4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	4.5-4.6	7	0.4	0	0.0	2	1.1	2	0.9	2	0.7	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	4.7-4.8	13	0.8	1	1.3	4	2.1	2	0.9	2	0.7	1	0.3	3	0.6	0	0.0	3	1.0
	4.9-5.0	49	2.9	11	13.8	14	7.4	10	4.4	6	2.2	4	1.1	4	0.8	3	0.7	1	0.3
	5.1-5.2	138	8.3	15	18.8	46	24.5	27	12.0	24	8.9	9	2.4	17	3.3	10	2.3	13	4.2
	5.3	114	6.9	8	10.0	23	12.2	22	9.8	17	6.3	20	5.3	24	4.6	22	5.1	16	5.1
	5.4	138	8.3	11	13.8	19	10.1	34	15.1	23	8.5	21	5.6	30	5.7	20	4.6	21	6.7
	5.5	203	12.2	14	17.5	23	12.2	34	15.1	31	11.4	46	12.2	55	10.5	55	12.8	34	10.9
	5.6	162	9.7	8	10.0	19	10.1	25	11.1	41	15.1	35	9.3	34	6.5	34	7.9	18	5.8
	5.7	180	10.8	3	3.8	14	7.4	24	10.7	29	10.7	55	14.6	55	10.5	48	11.1	34	10.9
	5.8	151	9.1	3	3.8	8	4.3	15	6.7	24	8.9	41	10.8	60	11.5	50	11.6	37	11.8
	5.9	130	7.8	4	5.0	7	3.7	11	4.9	24	8.9	36	9.5	48	9.2	41	9.5	28	8.9
	6.0	106	6.4	1	1.3	2	1.1	5	2.2	19	7.0	30	7.9	49	9.4	41	9.5	23	7.3
	6.1	82	4.9	0	0.0	3	1.6	6	2.7	12	4.4	29	7.7	32	6.1	35	8.1	17	5.4
	6.2	53	3.2	1	1.3	2	1.1	1	0.4	5	1.8	14	3.7	30	5.7	25	5.8	16	5.1
	6.3	33	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	9	2.4	21	4.0	9	2.1	14	4.5
	6.4	27	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	2	0.5	21	4.0	11	2.6	11	3.5
	6.5	18	1.1	0	0.0	1	0.5	3	1.3	2	0.7	4	1.1	8	1.5	3	0.7	7	2.2
	6.6-6.7	28	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.1	10	2.6	14	2.7	10	2.3	11	3.5
	6.8-6.9	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.6	4	0.8	4	0.9	3	1.0
	7.0-7.1	6	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.5	3	0.6	4	0.9	1	0.3
	7.2-7.3	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.8	2	0.5	2	0.6
	7.4-7.5	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	3	0.6	3	0.7	1	0.3
	7.6-7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	7.8-7.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.2-8.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4-8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.6-8.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	8.8-8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.0-9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.2-9.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	9.4以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0

注1) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射または血糖を下げる薬を使用して (30年)

いない20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定は p. 6 参照。

第32表の4 ヘモグロビン A1c (NGSP) の平均値及び標準偏差一年齢階級別、人数、平均値、標準偏差
—総数・男性・女性、20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用除者〕

(%)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	2,743	5.7	0.6	131	5.3	0.3	290	5.4	0.3	365	5.5	0.4	414	5.7	0.4	639	5.9	0.7	904	5.9	0.5	723	5.9	0.7	558	5.9	0.5
男性	1,079	5.7	0.7	51	5.3	0.3	102	5.3	0.4	140	5.5	0.4	143	5.7	0.4	261	5.9	1.0	382	5.9	0.6	292	5.9	0.9	245	5.9	0.6
女性	1,664	5.7	0.4	80	5.4	0.3	188	5.4	0.3	225	5.5	0.4	271	5.6	0.4	378	5.8	0.4	522	5.9	0.5	431	5.8	0.4	313	5.8	0.5

注1) ヘモグロビン A1c (NGSP) の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬を使用して (30年)

いない20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定は p. 6 参照。

第33表の1 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
男性	総数	899	100.0	40	100.0	74	100.0	110	100.0	126	100.0	229	100.0	320	100.0	255	100.0	202	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	55	6.1	3	7.5	10	13.5	8	7.3	14	11.1	12	5.2	8	2.5	12	4.7	5	2.5
	80-99	465	51.7	32	80.0	55	74.3	82	74.5	69	54.8	107	46.7	120	37.5	106	41.6	72	35.6
	100-119	208	23.1	4	10.0	8	10.8	15	13.6	26	20.6	64	27.9	91	28.4	68	26.7	61	30.2
	120-139	79	8.8	1	2.5	1	1.4	1	0.9	8	6.3	15	6.6	53	16.6	33	12.9	30	14.9
	140-159	40	4.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	5	4.0	13	5.7	21	6.6	13	5.1	17	8.4
	160-179	17	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.6	6	2.6	8	2.5	7	2.7	5	2.5
	180-199	11	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.8	2	0.9	7	2.2	4	1.6	4	2.0
	200-219	7	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	1.3	3	0.9	2	0.8	3	1.5
	220-239	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	2	1.0
	240-259	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	2	0.6	3	1.2	2	1.0
	260mg/dL以上	9	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.7	5	1.6	7	2.7	1	0.5
	(再掲)110以上	231	25.7	1	2.5	2	2.7	6	5.5	23	18.3	64	27.9	135	42.2	94	36.9	85	42.1
女性	総数	1,275	100.0	64	100.0	118	100.0	162	100.0	207	100.0	307	100.0	417	100.0	337	100.0	255	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.4
	60-79	70	5.5	7	10.9	17	14.4	6	3.7	13	6.3	12	3.9	15	3.6	15	4.5	7	2.7
	80-99	708	55.5	47	73.4	87	73.7	120	74.1	152	73.4	149	48.5	153	36.7	142	42.1	86	33.7
	100-119	351	27.5	8	12.5	14	11.9	28	17.3	34	16.4	112	36.5	155	37.2	132	39.2	95	37.3
	120-139	84	6.6	2	3.1	0	0.0	6	3.7	6	2.9	16	5.2	54	12.9	27	8.0	38	14.9
	140-159	25	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	9	2.9	15	3.6	9	2.7	11	4.3
	160-179	19	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.0	15	3.6	6	1.8	10	3.9
	180-199	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	5	1.2	4	1.2	3	1.2
	200-219	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	240-259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	2	0.8
	(再掲)110以上	260	20.4	4	6.3	5	4.2	15	9.3	15	7.2	62	20.2	159	38.1	92	27.3	107	42.0

注) 血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち，血液採取が食後3時間以降に行われた者を集計対象とした。

(30年)

第33表の2 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	899	107.4	41.9	40	91.2	8.7	74	90.3	9.8	110	94.5	20.5	126	100.3	23.0	229	112.6	55.5	320	117.0	45.6	255	117.8	61.0	202	116.5	40.6
女性	1,275	100.9	21.8	64	91.8	11.2	118	89.8	10.0	162	95.6	17.5	207	94.6	15.6	307	102.6	20.8	417	109.5	26.5	337	104.5	21.5	255	112.0	28.8

注) 血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち，血液採取が食後3時間以降に行われた者を集計対象とした。

(30年)

第33表の3 血糖値の分布－血糖値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
男性	総数	801	100.0	40	100.0	74	100.0	105	100.0	112	100.0	195	100.0	275	100.0	209	100.0	179	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60-79	54	6.7	3	7.5	10	13.5	7	6.7	14	12.5	12	6.2	8	2.9	12	5.7	5	2.8
	80-99	453	56.6	32	80.0	55	74.3	81	77.1	66	58.9	104	53.3	115	41.8	101	48.3	70	39.1
	100-119	179	22.3	4	10.0	8	10.8	14	13.3	21	18.8	52	26.7	80	29.1	54	25.8	56	31.3
	120-139	64	8.0	1	2.5	1	1.4	1	1.0	8	7.1	10	5.1	43	15.6	25	12.0	25	14.0
	140-159	24	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	6	3.1	17	6.2	6	2.9	15	8.4
	160-179	11	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	4	2.1	5	1.8	4	1.9	3	1.7
	180-199	8	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	2	1.0	4	1.5	2	1.0	3	1.7
	200-219	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.5	1	0.6
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.6
	240-259	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	260mg/dL以上	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	1	0.4	3	1.4	0	0.0
	(再掲)110以上	162	20.2	1	2.5	2	2.7	4	3.8	15	13.4	39	20.0	101	36.7	60	28.7	67	37.4
女性	総数	1,223	100.0	64	100.0	118	100.0	160	100.0	205	100.0	289	100.0	387	100.0	315	100.0	236	100.0
	40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-59	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	60-79	70	5.7	7	10.9	17	14.4	6	3.8	13	6.3	12	4.2	15	3.9	15	4.8	7	3.0
	80-99	699	57.2	47	73.4	87	73.7	119	74.4	152	74.1	145	50.2	149	38.5	140	44.4	83	35.2
	100-119	340	27.8	8	12.5	14	11.9	28	17.5	34	16.6	108	37.4	148	38.2	123	39.0	94	39.8
	120-139	71	5.8	2	3.1	0	0.0	5	3.1	5	2.4	12	4.2	47	12.1	22	7.0	33	14.0
	140-159	20	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	8	2.8	11	2.8	7	2.2	8	3.4
	160-179	14	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.7	11	2.8	5	1.6	7	3.0
	180-199	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.8	3	1.0	1	0.4
	200-219	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	220-239	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4
	240-259	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260mg/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	(再掲)110以上	220	18.0	4	6.3	5	4.2	14	8.8	13	6.3	50	17.3	134	34.6	75	23.8	91	38.6

注1) 血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち、血液採取を食後3時間以降に行い、かつ身体状況調査の問診においてイン (30年)

スリン注射又は血糖を下げる薬を使用していない者を集計対象とした。

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定はp. 6参照。

第33表の4 血糖値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上
〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	801	102.1	31.6	40	91.2	8.7	74	90.3	9.8	105	93.0	15.3	112	96.6	18.3	195	106.3	49.0	275	109.6	28.1	209	109.0	48.9	179	110.2	25.7
女性	1,223	99.3	18.3	64	91.8	11.2	118	89.8	10.0	160	95.4	17.4	205	93.7	11.3	289	100.8	16.5	387	106.9	22.2	315	102.9	18.8	236	108.5	22.4

注1) 血糖値の測定を行った20歳以上の者のうち、血液採取を食後3時間以降に行い、かつ身体状況調査の問診においてイン (30年)

スリン注射又は血糖を下げる薬を使用していない者を集計対象とした。

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定はp. 6参照。

第34表の1 血清総コレステロール値の分布—血清総コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%								
男性	総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	928	100.0	350	100.0	274	100.0
	120mg/dL未満	9	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.3	5	1.1	7	0.8	5	1.4	3	1.1
	120-139	34	2.8	6	11.5	3	2.9	3	2.1	4	2.5	4	1.3	14	3.2	20	2.2	5	1.4	11	4.0
	140-159	106	8.8	9	17.3	7	6.8	6	4.1	16	10.0	16	5.3	52	11.8	73	7.9	22	6.3	43	15.7
	160-179	196	16.3	11	21.2	17	16.5	12	8.2	19	11.9	51	16.9	86	19.5	141	15.2	64	18.3	58	21.2
	180-199	257	21.4	12	23.1	26	25.2	28	19.2	28	17.5	55	18.2	108	24.5	187	20.2	72	20.6	69	25.2
	200-219	270	22.4	7	13.5	29	28.2	37	25.3	41	25.6	75	24.8	81	18.4	213	23.0	84	24.0	43	15.7
	220-239	184	15.3	5	9.6	12	11.7	24	16.4	30	18.8	58	19.2	55	12.5	155	16.7	58	16.6	28	10.2
	240-259	101	8.4	2	3.8	3	2.9	23	15.8	16	10.0	31	10.3	26	5.9	94	10.1	33	9.4	11	4.0
	260-279	29	2.4	0	0.0	4	3.9	8	5.5	4	2.5	5	1.7	8	1.8	24	2.6	5	1.4	5	1.8
	280-299	13	1.1	0	0.0	2	1.9	3	2.1	2	1.3	2	0.7	4	0.9	10	1.1	1	0.3	3	1.1
	300mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	0.3	1	0.2	4	0.4	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	1,286	100.0	457	100.0	345	100.0
	120mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	24	1.4	1	1.2	8	4.3	4	1.7	3	1.1	0	0.0	8	1.4	11	0.9	3	0.7	5	1.4
	140-159	111	6.4	16	19.3	24	12.8	18	7.8	5	1.8	13	3.3	35	6.2	56	4.4	19	4.2	24	7.0
	160-179	221	12.7	25	30.1	40	21.3	34	14.8	17	6.2	26	6.5	79	13.9	125	9.7	44	9.6	55	15.9
	180-199	363	20.8	19	22.9	53	28.2	51	22.2	46	16.7	75	18.8	119	21.0	245	19.1	86	18.8	81	23.5
	200-219	380	21.8	14	16.9	26	13.8	62	27.0	54	19.6	95	23.8	129	22.8	301	23.4	104	22.8	81	23.5
	220-239	274	15.7	5	6.0	14	7.4	31	13.5	52	18.9	78	19.5	94	16.6	229	17.8	94	20.6	47	13.6
	240-259	214	12.3	2	2.4	14	7.4	18	7.8	63	22.9	58	14.5	59	10.4	182	14.2	59	12.9	32	9.3
	260-279	95	5.5	1	1.2	4	2.1	11	4.8	22	8.0	29	7.3	28	4.9	83	6.5	27	5.9	13	3.8
	280-299	34	2.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	9	3.3	14	3.5	9	1.6	32	2.5	12	2.6	4	1.2
	300mg/dL以上	25	1.4	0	0.0	3	1.6	0	0.0	4	1.5	11	2.8	7	1.2	22	1.7	9	2.0	3	0.9

注) 血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)
 ※年齢調整した, 血清総コレステロール 240mg/dL以上の者(20歳以上)の割合は, 男性12.2%, 女性18.8%。
 年齢調整値は, 平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第34表の2 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	199.2	34.8	52	182.4	31.9	103	198.8	33.1	146	213.3	36.0	160	203.1	34.4	302	202.9	33.3	440	192.7	34.1	928	202.0	34.8	350	199.7	32.7	274	187.7	33.6
女性	1,742	209.8	36.5	83	183.9	28.5	188	192.4	36.8	230	201.6	32.4	275	224.0	34.1	399	221.0	35.4	567	208.0	35.4	1,286	215.4	35.7	457	216.2	35.5	345	203.4	33.9

注) 血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第34表の3 血清総コレステロール値の分布—血清総コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%										
男性	総数	993	100.0	52	100.0	102	100.0	142	100.0	131	100.0	235	100.0	331	100.0	748	100.0	270	100.0	203	100.0
	120mg/dL未満	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	4	1.2	6	0.8	4	1.5	2	1.0
	120-139	28	2.8	6	11.5	3	2.9	3	2.1	2	1.5	3	1.3	11	3.3	14	1.9	3	1.1	9	4.4
	140-159	77	7.8	9	17.3	7	6.9	6	4.2	9	6.9	11	4.7	35	10.6	49	6.6	14	5.2	29	14.3
	160-179	147	14.8	11	21.2	17	16.7	11	7.7	14	10.7	33	14.0	61	18.4	99	13.2	41	15.2	43	21.2
	180-199	218	22.0	12	23.1	25	24.5	28	19.7	26	19.8	43	18.3	84	25.4	158	21.1	62	23.0	49	24.1
	200-219	223	22.5	7	13.5	29	28.4	35	24.6	34	26.0	53	22.6	65	19.6	169	22.6	62	23.0	35	17.2
	220-239	160	16.1	5	9.6	12	11.8	23	16.2	25	19.1	53	22.6	42	12.7	133	17.8	49	18.1	23	11.3
	240-259	92	9.3	2	3.8	3	2.9	23	16.2	15	11.5	28	11.9	21	6.3	86	11.5	30	11.1	8	3.9
	260-279	26	2.6	0	0.0	4	3.9	8	5.6	4	3.1	5	2.1	5	1.5	21	2.8	3	1.1	4	2.0
	280-299	11	1.1	0	0.0	2	2.0	3	2.1	2	1.5	2	0.9	2	0.6	9	1.2	1	0.4	1	0.5
	300mg/dL以上	4	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	0.4	1	0.3	4	0.5	1	0.4	0	0.0
女性	総数	1,351	100.0	82	100.0	185	100.0	223	100.0	244	100.0	283	100.0	334	100.0	976	100.0	300	100.0	200	100.0
	120mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	18	1.3	1	1.2	8	4.3	4	1.8	3	1.2	0	0.0	2	0.6	8	0.8	1	0.3	1	0.5
	140-159	85	6.3	16	19.5	24	13.0	16	7.2	5	2.0	4	1.4	20	6.0	34	3.5	9	3.0	14	7.0
	160-179	153	11.3	24	29.3	39	21.1	34	15.2	16	6.6	12	4.2	28	8.4	76	7.8	12	4.0	24	12.0
	180-199	262	19.4	19	23.2	52	28.1	51	22.9	35	14.3	46	16.3	59	17.7	167	17.1	47	15.7	40	20.0
	200-219	280	20.7	14	17.1	25	13.5	59	26.5	46	18.9	67	23.7	69	20.7	216	22.1	61	20.3	47	23.5
	220-239	227	16.8	5	6.1	14	7.6	30	13.5	47	19.3	59	20.8	72	21.6	193	19.8	78	26.0	34	17.0
	240-259	188	13.9	2	2.4	14	7.6	18	8.1	59	24.2	50	17.7	45	13.5	160	16.4	48	16.0	24	12.0
	260-279	83	6.1	1	1.2	4	2.2	10	4.5	20	8.2	22	7.8	26	7.8	72	7.4	25	8.3	11	5.5
	280-299	31	2.3	0	0.0	1	0.5	1	0.4	9	3.7	14	4.9	6	1.8	30	3.1	11	3.7	2	1.0
	300mg/dL以上	23	1.7	0	0.0	3	1.6	0	0.0	4	1.6	9	3.2	7	2.1	20	2.0	8	2.7	3	1.5

注) 血清総コレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第34表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	993	201.1	34.8	52	182.4	31.9	102	198.9	33.2	142	213.5	36.3	131	207.2	32.8	235	206.6	33.9	331	193.2	33.5	748	204.7	34.7	270	202.3	32.3	203	188.0	32.9
女性	1,351	212.5	37.5	82	184.0	28.7	185	192.4	37.0	223	201.5	32.1	244	225.3	34.9	283	226.8	34.7	334	216.7	36.5	976	219.7	36.0	300	225.4	34.9	200	209.8	35.0

注) 血清総コレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第35表の1 血清HDLコレステロール値の分布—血清HDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	928	100.0	350	100.0	274	100.0
女性	30mg/dL未満	9	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	6	1.4	6	0.6	4	1.1	3	1.1
	30-39	106	8.8	2	3.8	9	8.7	10	6.8	13	8.1	26	8.6	46	10.5	83	8.9	38	10.9	27	9.9
	40-49	281	23.4	15	28.8	25	24.3	26	17.8	31	19.4	66	21.9	118	26.8	206	22.2	76	21.7	83	30.3
	50-59	343	28.5	9	17.3	31	30.1	48	32.9	49	30.6	82	27.2	124	28.2	271	29.2	94	26.9	78	28.5
	60-69	234	19.5	12	23.1	23	22.3	38	26.0	27	16.9	58	19.2	76	17.3	179	19.3	72	20.6	37	13.5
	70-79	123	10.2	8	15.4	6	5.8	15	10.3	20	12.5	28	9.3	46	10.5	99	10.7	28	8.0	33	12.0
	80-89	59	4.9	4	7.7	5	4.9	5	3.4	12	7.5	22	7.3	11	2.5	46	5.0	16	4.6	7	2.6
	90-99	35	2.9	2	3.8	2	1.9	2	1.4	5	3.1	13	4.3	11	2.5	26	2.8	17	4.9	5	1.8
100mg/dL以上	13	1.1	0	0.0	1	1.0	2	1.4	2	1.3	6	2.0	2	0.5	12	1.3	5	1.4	1	0.4	
女性	総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	1,286	100.0	457	100.0	345	100.0
男性	30mg/dL未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.2	3	0.2	2	0.4	0	0.0
	30-39	44	2.5	1	1.2	1	0.5	5	2.2	3	1.1	6	1.5	28	4.9	31	2.4	14	3.1	18	5.2
	40-49	176	10.1	5	6.0	16	8.5	12	5.2	19	6.9	36	9.0	88	15.5	120	9.3	48	10.5	64	18.6
	50-59	358	20.6	16	19.3	38	20.2	34	14.8	32	11.6	92	23.1	146	25.7	255	19.8	108	23.6	90	26.1
	60-69	462	26.5	27	32.5	61	32.4	69	30.0	62	22.5	115	28.8	128	22.6	341	26.5	137	30.0	66	19.1
	70-79	349	20.0	21	25.3	33	17.6	58	25.2	64	23.3	83	20.8	90	15.9	262	20.4	82	17.9	56	16.2
	80-89	187	10.7	8	9.6	20	10.6	25	10.9	49	17.8	33	8.3	52	9.2	144	11.2	35	7.7	34	9.9
	90-99	99	5.7	1	1.2	11	5.9	21	9.1	25	9.1	21	5.3	20	3.5	82	6.4	20	4.4	8	2.3
100mg/dL以上	64	3.7	4	4.8	8	4.3	5	2.2	21	7.6	12	3.0	14	2.5	48	3.7	11	2.4	9	2.6	

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第35表の2 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)40-79歳			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	57.4	15.5	52	59.6	14.7	103	55.6	14.4	146	57.8	14.1	160	59.4	15.9	302	59.5	17.0	440	55.3	14.8	928	57.7	15.7	350	57.8	17.0	274	54.7	14.0
女性	1,742	67.2	16.3	83	68.1	13.8	188	68.3	15.4	230	69.7	14.2	275	74.0	18.1	399	66.5	15.2	567	63.1	16.2	1,286	67.8	16.5	457	64.8	15.8	345	62.3	16.0

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第35表の3 血清HDLコレステロール値の分布—血清HDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)40-79歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	993	100.0	52	100.0	102	100.0	142	100.0	131	100.0	235	100.0	331	100.0	748	100.0	270	100.0	203	100.0
女性	30mg/dL未満	7	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.8	1	0.4	4	1.2	4	0.5	3	1.1	2	1.0
	30-39	82	8.3	2	3.8	9	8.8	10	7.0	10	7.6	18	7.7	33	10.0	63	8.4	29	10.7	17	8.4
	40-49	233	23.5	15	28.8	25	24.5	26	18.3	25	19.1	49	20.9	93	28.1	163	21.8	58	21.5	66	32.5
	50-59	278	28.0	9	17.3	31	30.4	47	33.1	37	28.2	65	27.7	89	26.9	214	28.6	67	24.8	57	28.1
	60-69	198	19.9	12	23.1	23	22.5	36	25.4	23	17.6	46	19.6	58	17.5	149	19.9	56	20.7	28	13.8
	70-79	102	10.3	8	15.4	6	5.9	14	9.9	19	14.5	19	8.1	36	10.9	82	11.0	25	9.3	23	11.3
	80-89	51	5.1	4	7.7	4	3.9	5	3.5	9	6.9	20	8.5	9	2.7	40	5.3	14	5.2	6	3.0
	90-99	32	3.2	2	3.8	2	2.0	2	1.4	5	3.8	12	5.1	9	2.7	24	3.2	15	5.6	4	2.0
100mg/dL以上	10	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.4	2	1.5	5	2.1	0	0.0	9	1.2	3	1.1	0	0.0	
女性	総数	1,351	100.0	82	100.0	185	100.0	223	100.0	244	100.0	283	100.0	334	100.0	976	100.0	300	100.0	200	100.0
男性	30mg/dL未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.3	3	0.3	2	0.7	0	0.0
	30-39	29	2.1	1	1.2	1	0.5	4	1.8	2	0.8	4	1.4	17	5.1	20	2.0	10	3.3	10	5.0
	40-49	121	9.0	5	6.1	16	8.6	11	4.9	15	6.1	20	7.1	54	16.2	76	7.8	28	9.3	41	20.5
	50-59	252	18.7	16	19.5	38	20.5	33	14.8	30	12.3	59	20.8	76	22.8	175	17.9	60	20.0	49	24.5
	60-69	362	26.8	26	31.7	58	31.4	68	30.5	53	21.7	82	29.0	75	22.5	258	26.4	91	30.3	37	18.5
	70-79	283	20.9	21	25.6	33	17.8	56	25.1	57	23.4	63	22.3	53	15.9	211	21.6	56	18.7	31	15.5
	80-89	160	11.8	8	9.8	20	10.8	24	10.8	44	18.0	26	9.2	38	11.4	120	12.3	29	9.7	23	11.5
	90-99	87	6.4	1	1.2	11	5.9	21	9.4	23	9.4	17	6.0	14	4.2	72	7.4	16	5.3	5	2.5
100mg/dL以上	54	4.0	4	4.9	8	4.3	5	2.2	20	8.2	11	3.9	6	1.8	41	4.2	8	2.7	4	2.0	

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第35表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)40-79歳			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	993	57.7	15.5	52	59.6	14.7	102	55.3	14.3	142	57.8	14.2	131	60.4	16.3	235	60.3	17.5	331	55.3	14.4	748	58.3	15.8	270	58.3	17.0	203	54.8	13.7
女性	1,351	68.5	16.3	82	68.1	13.9	185	68.3	15.5	223	69.9	14.1	244	74.6	18.3	283	68.1	15.6	334	63.6	16.3	976	69.3	16.5	300	66.2	16.2	200	62.3	16.1

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第36表の1 血清LDLコレステロール値(直接法)の分布-血清LDLコレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合-男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	928	100.0	350	100.0	274	100.0
	40mg/dL未満	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.0	1	0.2	5	0.5	3	0.9	0	0.0
	40-49	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	1	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.4
	50-59	29	2.4	1	1.9	4	3.9	4	2.7	3	1.9	8	2.6	9	2.0	22	2.4	11	3.1	5	1.8
	60-69	45	3.7	5	9.6	1	1.0	2	1.4	5	3.1	10	3.3	22	5.0	28	3.0	10	2.9	19	6.9
	70-79	67	5.6	4	7.7	3	2.9	4	2.7	11	6.9	12	4.0	33	7.5	51	5.5	16	4.6	25	9.1
	80-89	94	7.8	4	7.7	8	7.8	4	2.7	8	5.0	21	7.0	49	11.1	58	6.3	26	7.4	37	13.5
	90-99	124	10.3	9	17.3	11	10.7	10	6.8	15	9.4	31	10.3	48	10.9	95	10.2	38	10.9	33	12.0
	100-109	158	13.1	5	9.6	17	16.5	19	13.0	24	15.0	38	12.6	55	12.5	123	13.3	44	12.6	31	11.3
	110-119	150	12.5	10	19.2	10	9.7	15	10.3	22	13.8	38	12.6	55	12.5	118	12.7	50	14.3	30	10.9
	120-129	136	11.3	4	7.7	16	15.5	15	10.3	13	8.1	33	10.9	55	12.5	102	11.0	39	11.1	36	13.1
	130-139	129	10.7	2	3.8	11	10.7	15	10.3	19	11.9	39	12.9	43	9.8	102	11.0	39	11.1	25	9.1
	140-149	106	8.8	3	5.8	11	10.7	22	15.1	13	8.1	30	9.9	27	6.1	88	9.5	36	10.3	10	3.6
	150-159	60	5.0	4	7.7	2	1.9	8	5.5	8	5.0	18	6.0	20	4.5	51	5.5	19	5.4	10	3.6
	160-169	49	4.1	1	1.9	4	3.9	17	11.6	5	3.1	13	4.3	9	2.0	42	4.5	13	3.7	3	1.1
	170-179	20	1.7	0	0.0	1	1.0	4	2.7	6	3.8	4	1.3	5	1.1	18	1.9	3	0.9	4	1.5
	180-189	12	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.4	4	2.5	3	1.0	2	0.5	11	1.2	1	0.3	1	0.4
	190-199	11	0.9	0	0.0	1	1.0	3	2.1	2	1.3	0	0.0	5	1.1	9	1.0	1	0.3	4	1.5
	200-209	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	210-219	2	0.2	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.2	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	1,286	100.0	457	100.0	345	100.0
	40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	40-49	4	0.2	0	0.0	3	1.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	50-59	23	1.3	4	4.8	4	2.1	6	2.6	4	1.5	1	0.3	4	0.7	14	1.1	2	0.4	3	0.9
	60-69	48	2.8	5	6.0	9	4.8	10	4.3	2	0.7	5	1.3	17	3.0	28	2.2	12	2.6	8	2.3
	70-79	72	4.1	10	12.0	10	5.3	12	5.2	4	1.5	7	1.8	29	5.1	38	3.0	12	2.6	22	6.4
	80-89	132	7.6	6	7.2	23	12.2	18	7.8	16	5.8	20	5.0	49	8.6	87	6.8	24	5.3	37	10.7
	90-99	191	11.0	13	15.7	29	15.4	21	9.1	29	10.5	31	7.8	68	12.0	124	9.6	45	9.8	41	11.9
	100-109	225	12.9	17	20.5	33	17.6	38	16.5	24	8.7	43	10.8	70	12.3	149	11.6	52	11.4	43	12.5
	110-119	236	13.5	10	12.0	20	10.6	27	11.7	32	11.6	68	17.0	79	13.9	175	13.6	69	15.1	55	15.9
	120-129	205	11.8	5	6.0	18	9.6	34	14.8	31	11.3	54	13.5	63	11.1	159	12.4	52	11.4	44	12.8
	130-139	179	10.3	6	7.2	14	7.4	22	9.6	36	13.1	41	10.3	60	10.6	142	11.0	56	12.3	32	9.3
	140-149	149	8.6	4	4.8	8	4.3	14	6.1	28	10.2	43	10.8	52	9.2	126	9.8	53	11.6	23	6.7
	150-159	99	5.7	2	2.4	6	3.2	14	6.1	22	8.0	24	6.0	31	5.5	83	6.5	30	6.6	14	4.1
	160-169	78	4.5	0	0.0	5	2.7	2	0.9	29	10.5	20	5.0	22	3.9	68	5.3	18	3.9	13	3.8
	170-179	38	2.2	0	0.0	3	1.6	5	2.2	5	1.8	16	4.0	9	1.6	34	2.6	17	3.7	4	1.2
	180-189	24	1.4	0	0.0	0	0.0	5	2.2	4	1.5	11	2.8	4	0.7	23	1.8	6	1.3	1	0.3
	190-199	20	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.5	9	2.3	6	1.1	20	1.6	3	0.7	4	1.2
	200-209	10	0.6	1	1.2	1	0.5	1	0.4	1	0.4	4	1.0	2	0.4	8	0.6	3	0.7	0	0.0
	210-219	3	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	5	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.4	4	0.3	3	0.7	1	0.3

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第36表の2 血清LDLコレステロール値(直接法)の平均値及び標準偏差-年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差-男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	115.6	30.9	52	106.7	27.4	103	117.9	30.8	146	128.9	32.1	160	117.3	32.2	302	116.0	30.1	440	110.9	29.6	928	117.4	31.0	350	114.8	29.5	274	107.3	29.2
女性	1,742	119.3	30.9	83	102.1	27.2	188	107.9	30.2	230	114.9	29.7	275	127.1	30.8	399	128.0	30.2	567	117.5	29.7	1,286	123.2	30.9	457	124.1	29.7	345	114.3	28.5

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第36表の3 血清LDLコレステロール値（直接法）の分布—血清LDLコレステロール値の区分、年齢階級別、人数、割合—
男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	993	100.0	52	100.0	102	100.0	142	100.0	131	100.0	235	100.0	331	100.0	748	100.0	270	100.0	203	100.0
総数	993	100.0	52	100.0	102	100.0	142	100.0	131	100.0	235	100.0	331	100.0	748	100.0	270	100.0	203	100.0
40mg/dL未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.3	3	0.4	2	0.7	0	0.0
40-49	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.4	1	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.5
50-59	24	2.4	1	1.9	4	3.9	4	2.8	1	0.8	7	3.0	7	2.1	18	2.4	10	3.7	3	1.5
60-69	36	3.6	5	9.6	1	1.0	2	1.4	5	3.8	8	3.4	15	4.5	21	2.8	7	2.6	13	6.4
70-79	44	4.4	4	7.7	3	2.9	4	2.8	5	3.8	5	2.1	23	6.9	32	4.3	7	2.6	18	8.9
80-89	60	6.0	4	7.7	8	7.8	4	2.8	4	3.1	11	4.7	29	8.8	33	4.4	14	5.2	22	10.8
90-99	96	9.7	9	17.3	10	9.8	9	6.3	12	9.2	22	9.4	34	10.3	69	9.2	26	9.6	25	12.3
100-109	133	13.4	5	9.6	17	16.7	18	12.7	22	16.8	29	12.3	42	12.7	102	13.6	36	13.3	23	11.3
110-119	128	12.9	10	19.2	10	9.8	14	9.9	19	14.5	28	11.9	47	14.2	97	13.0	41	15.2	24	11.8
120-129	116	11.7	4	7.7	16	15.7	15	10.6	12	9.2	27	11.5	42	12.7	85	11.4	33	12.2	27	13.3
130-139	108	10.9	2	3.8	11	10.8	15	10.6	15	11.5	31	13.2	34	10.3	82	11.0	28	10.4	22	10.8
140-149	98	9.9	3	5.8	11	10.8	22	15.5	13	9.9	28	11.9	21	6.3	80	10.7	30	11.1	9	4.4
150-159	53	5.3	4	7.7	2	2.0	7	4.9	6	4.6	17	7.2	17	5.1	45	6.0	17	6.3	8	3.9
160-169	46	4.6	1	1.9	4	3.9	17	12.0	4	3.1	12	5.1	8	2.4	40	5.3	13	4.8	2	1.0
170-179	20	2.0	0	0.0	1	1.0	4	2.8	6	4.6	4	1.7	5	1.5	18	2.4	3	1.1	4	2.0
180-189	11	1.1	0	0.0	1	1.0	2	1.4	4	3.1	3	1.3	1	0.3	10	1.3	1	0.4	0	0.0
190-199	9	0.9	0	0.0	1	1.0	3	2.1	2	1.5	0	0.0	3	0.9	8	1.1	1	0.4	2	1.0
200-209	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
210-219	2	0.2	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	1	0.4	0	0.0
女性	1,351	100.0	82	100.0	185	100.0	223	100.0	244	100.0	283	100.0	334	100.0	976	100.0	300	100.0	200	100.0
総数	1,351	100.0	82	100.0	185	100.0	223	100.0	244	100.0	283	100.0	334	100.0	976	100.0	300	100.0	200	100.0
40mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
40-49	4	0.3	0	0.0	3	1.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
50-59	20	1.5	4	4.9	4	2.2	5	2.2	4	1.6	1	0.4	2	0.6	12	1.2	2	0.7	1	0.5
60-69	36	2.7	5	6.1	9	4.9	10	4.5	2	0.8	4	1.4	6	1.8	21	2.2	7	2.3	1	0.5
70-79	49	3.6	10	12.2	10	5.4	12	5.4	3	1.2	1	0.4	13	3.9	20	2.0	3	1.0	11	5.5
80-89	89	6.6	6	7.3	22	11.9	18	8.1	14	5.7	9	3.2	20	6.0	53	5.4	9	3.0	17	8.5
90-99	142	10.5	13	15.9	29	15.7	21	9.4	26	10.7	20	7.1	33	9.9	86	8.8	22	7.3	23	11.5
100-109	163	12.1	16	19.5	32	17.3	38	17.0	19	7.8	29	10.2	29	8.7	101	10.3	24	8.0	20	10.0
110-119	170	12.6	10	12.2	20	10.8	26	11.7	26	10.7	45	15.9	43	12.9	122	12.5	45	15.0	28	14.0
120-129	159	11.8	5	6.1	18	9.7	32	14.3	27	11.1	34	12.0	43	12.9	120	12.3	33	11.0	32	16.0
130-139	138	10.2	6	7.3	13	7.0	21	9.4	30	12.3	29	10.2	39	11.7	110	11.3	40	13.3	19	9.5
140-149	127	9.4	4	4.9	8	4.3	13	5.8	27	11.1	34	12.0	41	12.3	107	11.0	43	14.3	19	9.5
150-159	89	6.6	2	2.4	6	3.2	14	6.3	21	8.6	22	7.8	24	7.2	76	7.8	25	8.3	10	5.0
160-169	72	5.3	0	0.0	5	2.7	2	0.9	28	11.5	18	6.4	19	5.7	63	6.5	16	5.3	10	5.0
170-179	35	2.6	0	0.0	3	1.6	4	1.8	5	2.0	14	4.9	9	2.7	31	3.2	16	5.3	4	2.0
180-189	23	1.7	0	0.0	0	0.0	5	2.2	3	1.2	11	3.9	4	1.2	22	2.3	6	2.0	1	0.5
190-199	17	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.6	7	2.5	5	1.5	17	1.7	3	1.0	3	1.5
200-209	9	0.7	1	1.2	1	0.5	1	0.4	1	0.4	3	1.1	2	0.6	7	0.7	3	1.0	0	0.0
210-219	3	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
220mg/dL以上	5	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.6	4	0.4	3	1.0	1	0.5

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第36表の4 血清LDLコレステロール値（直接法）の平均値及び標準偏差—年齢階級別、人数、平均値、標準偏差—男性・女性、20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

(mg/dL)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	993	118.0	31.0	52	106.7	27.4	102	118.2	30.9	142	129.2	32.3	131	121.1	30.8	235	119.5	30.6	331	112.6	29.7	748	120.2	31.1	270	117.7	30.0	203	108.9	28.5
女性	1,351	121.8	31.9	82	102.1	27.4	185	107.9	30.4	223	114.6	29.5	244	128.1	31.5	283	132.7	30.7	334	125.2	30.8	976	126.8	31.7	300	131.4	30.3	200	120.3	29.5

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第37表の1 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の分布—血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,156	100.0	52	100.0	96	100.0	141	100.0	151	100.0	286	100.0	430	100.0	890	100.0	336	100.0	269	100.0
	40mg/dL未満	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	3	1.0	2	0.5	7	0.8	3	0.9	1	0.4
	40-49	12	1.0	0	0.0	1	1.0	1	0.7	2	1.3	3	1.0	5	1.2	9	1.0	2	0.6	4	1.5
	50-59	24	2.1	1	1.9	2	2.1	3	2.1	1	0.7	7	2.4	10	2.3	18	2.0	9	2.7	8	3.0
	60-69	52	4.5	9	17.3	2	2.1	1	0.7	6	4.0	11	3.8	23	5.3	33	3.7	13	3.9	16	5.9
	70-79	70	6.1	3	5.8	4	4.2	4	2.8	15	9.9	13	4.5	31	7.2	54	6.1	16	4.8	22	8.2
	80-89	104	9.0	5	9.6	12	12.5	8	5.7	10	6.6	26	9.1	43	10.0	74	8.3	30	8.9	31	11.5
	90-99	144	12.5	5	9.6	10	10.4	14	9.9	18	11.9	41	14.3	56	13.0	108	12.1	49	14.6	38	14.1
	100-109	159	13.8	8	15.4	19	19.8	21	14.9	22	14.6	34	11.9	55	12.8	120	13.5	34	10.1	38	14.1
	110-119	152	13.1	8	15.4	13	13.5	14	9.9	16	10.6	35	12.2	66	15.3	113	12.7	54	16.1	35	13.0
	120-129	136	11.8	3	5.8	11	11.5	18	12.8	20	13.2	37	12.9	47	10.9	113	12.7	43	12.8	24	8.9
	130-139	107	9.3	7	13.5	9	9.4	16	11.3	7	4.6	28	9.8	40	9.3	79	8.9	36	10.7	22	8.2
	140-149	70	6.1	1	1.9	4	4.2	15	10.6	9	6.0	21	7.3	20	4.7	60	6.7	22	6.5	10	3.7
	150-159	48	4.2	1	1.9	4	4.2	10	7.1	7	4.6	13	4.5	13	3.0	42	4.7	11	3.3	8	3.0
	160-169	32	2.8	0	0.0	1	1.0	8	5.7	7	4.6	10	3.5	6	1.4	30	3.4	8	2.4	4	1.5
	170-179	17	1.5	1	1.9	1	1.0	3	2.1	4	2.6	1	0.3	7	1.6	13	1.5	4	1.2	4	1.5
	180-189	8	0.7	0	0.0	1	1.0	1	0.7	3	2.0	1	0.3	2	0.5	7	0.8	1	0.3	1	0.4
	190-199	7	0.6	0	0.0	1	1.0	1	0.7	1	0.7	1	0.3	3	0.7	5	0.6	0	0.0	3	1.1
	200-209	4	0.3	0	0.0	1	1.0	2	1.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0
	210-219	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.2	1	0.3	0	0.0
女性	総数	1,706	100.0	83	100.0	185.0	100.0	230	100.0	266	100.0	389	100.0	553	100.0	1,258	100.0	446	100.0	337	100.0
	40mg/dL未満	3	0.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0
	40-49	6	0.4	1	1.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	2	0.2	0	0.0	3	0.9
	50-59	22	1.3	4	4.8	4	2.2	4	1.7	4	1.5	5	1.3	1	0.2	13	1.0	4	0.9	1	0.3
	60-69	61	3.6	7	8.4	13	7.0	14	6.1	3	1.1	6	1.5	18	3.3	35	2.8	15	3.4	7	2.1
	70-79	68	4.0	7	8.4	11	5.9	11	4.8	4	1.5	6	1.5	29	5.2	40	3.2	9	2.0	22	6.5
	80-89	150	8.8	12	14.5	23	12.4	22	9.6	18	6.8	20	5.1	55	9.9	94	7.5	26	5.8	43	12.8
	90-99	203	11.9	15	18.1	33	17.8	30	13.0	26	9.8	31	8.0	68	12.3	130	10.3	46	10.3	42	12.5
	100-109	229	13.4	13	15.7	30	16.2	39	17.0	26	9.8	48	12.3	73	13.2	158	12.6	56	12.6	44	13.1
	110-119	228	13.4	9	10.8	26	14.1	33	14.3	34	12.8	70	18.0	56	10.1	172	13.7	59	13.2	42	12.5
	120-129	191	11.2	5	6.0	5	2.7	23	10.0	30	11.3	61	15.7	67	12.1	161	12.8	72	16.1	38	11.3
	130-139	161	9.4	5	6.0	16	8.6	25	10.9	28	10.5	35	9.0	52	9.4	127	10.1	45	10.1	28	8.3
	140-149	126	7.4	4	4.8	7	3.8	8	3.5	27	10.2	28	7.2	52	9.4	99	7.9	38	8.5	29	8.6
	150-159	103	6.0	0	0.0	7	3.8	6	2.6	33	12.4	25	6.4	32	5.8	86	6.8	28	6.3	16	4.7
	160-169	60	3.5	0	0.0	3	1.6	5	2.2	18	6.8	17	4.4	17	3.1	53	4.2	15	3.4	9	2.7
	170-179	46	2.7	0	0.0	1	0.5	7	3.0	6	2.3	17	4.4	15	2.7	41	3.3	18	4.0	7	2.1
	180-189	18	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.9	4	1.5	8	2.1	4	0.7	18	1.4	4	0.9	1	0.3
	190-199	13	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	3	0.8	7	1.3	13	1.0	3	0.7	4	1.2
	200-209	10	0.6	1	1.2	1	0.5	1	0.4	1	0.4	6	1.5	0	0.0	8	0.6	2	0.4	0	0.0
	210-219	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0
	220mg/dL以上	6	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	0.5	5	0.4	4	0.9	1	0.3

注) 血清総コレステロール値，血清HDLコレステロール値及び血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行い，血清中性脂肪（トリグリセライド）が400mg/dL未満の20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL) - 中性脂肪 (mg/dL) / 5
 (中性脂肪 (トリグリセライド) が400mg/dL未満の場合。)

第37表の2 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,156	111.3	30.5	52	103.0	28.9	96	111.8	29.2	141	123.2	31.8	151	111.7	32.8	286	111.2	29.9	430	108.1	29.3	890	112.7	30.8	336	110.6	28.6	269	105.3	29.5
女性	1,706	117.4	30.9	83	98.9	25.8	185	104.0	29.1	230	110.8	28.2	266	126.5	29.6	389	125.4	30.6	553	117.4	30.7	1,258	121.2	30.9	446	122.1	30.4	337	114.5	29.6

注) 血清総コレステロール値，血清HDLコレステロール値及び血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行い，血清中性脂肪（トリグリセライド）が400mg/dL未満の20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL) - 中性脂肪 (mg/dL) / 5
 (中性脂肪 (トリグリセライド) が400mg/dL未満の場合。)

第37表の3 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の分布－血清LDLコレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	960	100.0	52	100.0	95	100.0	137	100.0	126	100.0	225	100.0	325	100.0	723	100.0	262	100.0	200	100.0
	40mg/dL未満	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	0.9	2	0.6	5	0.7	2	0.8	1	0.5
	40-49	10	1.0	0	0.0	1	1.1	1	0.7	1	0.8	3	1.3	4	1.2	8	1.1	2	0.8	3	1.5
	50-59	18	1.9	1	1.9	2	2.1	3	2.2	0	0.0	4	1.8	8	2.5	12	1.7	6	2.3	6	3.0
	60-69	39	4.1	9	17.3	2	2.1	1	0.7	5	4.0	8	3.6	14	4.3	23	3.2	9	3.4	9	4.5
	70-79	45	4.7	3	5.8	4	4.2	4	2.9	7	5.6	7	3.1	20	6.2	33	4.6	10	3.8	14	7.0
	80-89	76	7.9	5	9.6	11	11.6	7	5.1	9	7.1	18	8.0	26	8.0	50	6.9	18	6.9	20	10.0
	90-99	116	12.1	5	9.6	10	10.5	12	8.8	15	11.9	30	13.3	44	13.5	84	11.6	36	13.7	31	15.5
	100-109	131	13.6	8	15.4	19	20.0	21	15.3	20	15.9	24	10.7	39	12.0	96	13.3	27	10.3	25	12.5
	110-119	131	13.6	8	15.4	13	13.7	14	10.2	15	11.9	27	12.0	54	16.6	95	13.1	42	16.0	29	14.5
	120-129	117	12.2	3	5.8	11	11.6	18	13.1	19	15.1	30	13.3	36	11.1	96	13.3	32	12.2	20	10.0
	130-139	97	10.1	7	13.5	9	9.5	16	11.7	4	3.2	26	11.6	35	10.8	69	9.5	33	12.6	20	10.0
	140-149	66	6.9	1	1.9	4	4.2	14	10.2	9	7.1	20	8.9	18	5.5	57	7.9	20	7.6	9	4.5
	150-159	43	4.5	1	1.9	4	4.2	10	7.3	6	4.8	12	5.3	10	3.1	38	5.3	11	4.2	5	2.5
	160-169	31	3.2	0	0.0	1	1.1	8	5.8	6	4.8	10	4.4	6	1.8	29	4.0	8	3.1	4	2.0
	170-179	16	1.7	1	1.9	1	1.1	3	2.2	4	3.2	1	0.4	6	1.8	13	1.8	4	1.5	3	1.5
	180-189	8	0.8	0	0.0	1	1.1	1	0.7	3	2.4	1	0.4	2	0.6	7	1.0	1	0.4	1	0.5
	190-199	4	0.4	0	0.0	1	1.1	1	0.7	1	0.8	1	0.4	0	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0
	200-209	4	0.4	0	0.0	1	1.1	2	1.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0
	210-219	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.3	1	0.4	0	0.0
女性	総数	1,324	100.0	82	100.0	182.0	100.0	223	100.0	237	100.0	276	100.0	324	100.0	956	100.0	292	100.0	195	100.0
	40mg/dL未満	3	0.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.1	1	0.3	0	0.0
	40-49	4	0.3	1	1.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.5
	50-59	17	1.3	4	4.9	4	2.2	4	1.8	4	1.7	1	0.4	0	0.0	9	0.9	1	0.3	0	0.0
	60-69	44	3.3	7	8.5	13	7.1	13	5.8	3	1.3	3	1.1	5	1.5	23	2.4	7	2.4	1	0.5
	70-79	44	3.3	7	8.5	11	6.0	11	4.9	3	1.3	2	0.7	10	3.1	21	2.2	2	0.7	9	4.6
	80-89	106	8.0	12	14.6	23	12.6	21	9.4	16	6.8	7	2.5	27	8.3	58	6.1	8	2.7	24	12.3
	90-99	145	11.0	15	18.3	31	17.0	30	13.5	23	9.7	18	6.5	28	8.6	89	9.3	20	6.8	19	9.7
	100-109	169	12.8	12	14.6	30	16.5	38	17.0	21	8.9	34	12.3	34	10.5	113	11.8	32	11.0	21	10.8
	110-119	173	13.1	9	11.0	26	14.3	31	13.9	27	11.4	46	16.7	34	10.5	120	12.6	37	12.7	26	13.3
	120-129	150	11.3	5	6.1	5	2.7	22	9.9	26	11.0	45	16.3	47	14.5	127	13.3	54	18.5	26	13.3
	130-139	133	10.0	5	6.1	15	8.2	25	11.2	25	10.5	27	9.8	36	11.1	104	10.9	32	11.0	19	9.7
	140-149	100	7.6	4	4.9	7	3.8	8	3.6	26	11.0	23	8.3	32	9.9	82	8.6	28	9.6	19	9.7
	150-159	91	6.9	0	0.0	7	3.8	6	2.7	31	13.1	20	7.2	27	8.3	77	8.1	24	8.2	12	6.2
	160-169	57	4.3	0	0.0	3	1.6	4	1.8	18	7.6	17	6.2	15	4.6	51	5.3	15	5.1	7	3.6
	170-179	45	3.4	0	0.0	1	0.5	7	3.1	6	2.5	16	5.8	15	4.6	40	4.2	17	5.8	7	3.6
	180-189	14	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.9	3	1.3	6	2.2	3	0.9	14	1.5	4	1.4	0	0.0
	190-199	11	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	2	0.7	6	1.9	11	1.2	3	1.0	3	1.5
	200-209	10	0.8	1	1.2	1	0.5	1	0.4	1	0.4	6	2.2	0	0.0	8	0.8	2	0.7	0	0.0
	210-219	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2	1	0.3	0	0.0
	220mg/dL以上	6	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.9	5	0.5	4	1.4	1	0.5

注) 血清総コレステロール値，血清HDLコレステロール値及び血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行い，血清中性脂肪（トリグリセライド）が400mg/dL未満であり，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL) - 中性脂肪 (mg/dL) / 5 (中性脂肪 (トリグリセライド) が400mg/dL未満の場合。)

第37表の4 血清LDLコレステロール値（Friedewaldの式）の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	960	113.6	30.6	52	103.0	28.9	95	112.1	29.2	137	123.7	31.8	126	115.3	31.6	225	114.7	30.7	325	110.0	29.1	723	115.7	30.9	262	113.8	29.3	200	106.7	28.3
女性	1,324	120.0	31.7	82	98.8	26.0	182	104.0	29.2	223	110.8	28.2	237	127.7	30.1	276	131.2	30.2	324	125.5	31.3	956	125.1	31.4	292	130.0	30.6	195	120.7	30.0

注) 血清総コレステロール値，血清HDLコレステロール値及び血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行い，血清中性脂肪（トリグリセライド）が400mg/dL未満であり，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

Friedewaldの式 LDLコレステロール (mg/dL) = 総コレステロール (mg/dL) - HDLコレステロール (mg/dL) - 中性脂肪 (mg/dL) / 5 (中性脂肪 (トリグリセライド) が400mg/dL未満の場合。)

第38表の1 血清 non HDL コレステロール値の分布—血清 non HDL コレステロール値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	928	100.0	350	100.0	274	100.0
総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	928	100.0	350	100.0	274	100.0
70mg/dL未満	9	0.7	0	0.0	1	1.0	1	0.7	2	1.3	3	1.0	2	0.5	8	0.9	4	1.1	0	0.0
70-80未満	19	1.6	5	9.6	1	1.0	2	1.4	2	1.3	3	1.0	6	1.4	11	1.2	3	0.9	5	1.8
80-90未満	49	4.1	2	3.8	3	2.9	1	0.7	7	4.4	10	3.3	26	5.9	32	3.4	14	4.0	19	6.9
90-100未満	58	4.8	6	11.5	6	5.8	5	3.4	10	6.3	11	3.6	20	4.5	38	4.1	11	3.1	17	6.2
100-110未満	85	7.1	6	11.5	6	5.8	4	2.7	8	5.0	22	7.3	39	8.9	62	6.7	26	7.4	29	10.6
110-120未満	113	9.4	4	7.7	8	7.8	9	6.2	12	7.5	32	10.6	48	10.9	83	8.9	39	11.1	35	12.8
120-130未満	130	10.8	9	17.3	18	17.5	19	13.0	16	10.0	23	7.6	45	10.2	90	9.7	25	7.1	30	10.9
130-140未満	120	10.0	6	11.5	8	7.8	13	8.9	14	8.8	27	8.9	52	11.8	97	10.5	37	10.6	30	10.9
140-150未満	127	10.6	3	5.8	9	8.7	13	8.9	16	10.0	33	10.9	53	12.0	104	11.2	46	13.1	30	10.9
150-160未満	132	11.0	4	7.7	13	12.6	16	11.0	21	13.1	38	12.6	40	9.1	103	11.1	40	11.4	20	7.3
160-170未満	107	8.9	4	7.7	8	7.8	11	7.5	16	10.0	36	11.9	32	7.3	84	9.1	33	9.4	23	8.4
170-180未満	87	7.2	1	1.9	8	7.8	12	8.2	12	7.5	26	8.6	28	6.4	71	7.7	27	7.7	13	4.7
180-190未満	58	4.8	1	1.9	5	4.9	10	6.8	6	3.8	15	5.0	21	4.8	51	5.5	17	4.9	9	3.3
190-200未満	43	3.6	0	0.0	3	2.9	11	7.5	7	4.4	11	3.6	11	2.5	37	4.0	13	3.7	7	2.6
200-210未満	25	2.1	1	1.9	0	0.0	9	6.2	5	3.1	4	1.3	6	1.4	24	2.6	9	2.6	0	0.0
210-220未満	17	1.4	0	0.0	1	1.0	3	2.1	4	2.5	5	1.7	4	0.9	16	1.7	2	0.6	3	1.1
220mg/dL以上	24	2.0	0	0.0	5	4.9	7	4.8	2	1.3	3	1.0	7	1.6	17	1.8	4	1.1	4	1.5
女性	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	1,286	100.0	457	100.0	345	100.0
総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	1,286	100.0	457	100.0	345	100.0
70mg/dL未満	12	0.7	3	3.6	4	2.1	2	0.9	2	0.7	0	0.0	1	0.2	5	0.4	0	0.0	1	0.3
70-80未満	29	1.7	5	6.0	9	4.8	9	3.9	4	1.5	0	0.0	2	0.4	14	1.1	1	0.2	1	0.3
80-90未満	40	2.3	8	9.6	8	4.3	9	3.9	1	0.4	5	1.3	9	1.6	21	1.6	9	2.0	5	1.4
90-100未満	66	3.8	9	10.8	16	8.5	11	4.8	4	1.5	7	1.8	19	3.4	34	2.6	8	1.8	15	4.3
100-110未満	140	8.0	12	14.5	25	13.3	25	10.9	16	5.8	11	2.8	51	9.0	81	6.3	20	4.4	35	10.1
110-120未満	188	10.8	10	12.0	39	20.7	31	13.5	31	11.3	28	7.0	49	8.6	121	9.4	34	7.4	31	9.0
120-130未満	187	10.7	12	14.5	21	11.2	31	13.5	25	9.1	42	10.5	56	9.9	133	10.3	42	9.2	37	10.7
130-140未満	213	12.2	7	8.4	18	9.6	22	9.6	23	8.4	63	15.8	80	14.1	159	12.4	73	16.0	51	14.8
140-150未満	201	11.5	8	9.6	13	6.9	28	12.2	35	12.7	51	12.8	66	11.6	153	11.9	50	10.9	46	13.3
150-160未満	151	8.7	5	6.0	11	5.9	15	6.5	28	10.2	37	9.3	55	9.7	123	9.6	45	9.8	35	10.1
160-170未満	155	8.9	1	1.2	6	3.2	20	8.7	30	10.9	35	8.8	63	11.1	129	10.0	55	12.0	31	9.0
170-180未満	111	6.4	1	1.2	6	3.2	7	3.0	20	7.3	36	9.0	41	7.2	94	7.3	37	8.1	23	6.7
180-190未満	88	5.1	1	1.2	6	3.2	7	3.0	26	9.5	24	6.0	24	4.2	76	5.9	29	6.3	9	2.6
190-200未満	56	3.2	0	0.0	2	1.1	5	2.2	10	3.6	17	4.3	22	3.9	48	3.7	23	5.0	9	2.6
200-210未満	33	1.9	0	0.0	1	0.5	3	1.3	6	2.2	13	3.3	10	1.8	29	2.3	9	2.0	7	2.0
210-220未満	25	1.4	0	0.0	0	0.0	3	1.3	6	2.2	8	2.0	8	1.4	23	1.8	7	1.5	5	1.4
220mg/dL以上	47	2.7	1	1.2	3	1.6	2	0.9	8	2.9	22	5.5	11	1.9	43	3.3	15	3.3	4	1.2

注) 血清総コレステロール値及び血清 HDL コレステロール値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(30年)

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDLコレステロール (mg/dL)}$$

第38表の2 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	141.8	35.4	52	122.8	30.7	103	143.3	36.7	146	155.5	38.2	160	143.7	35.9	302	143.4	34.0	440	137.4	33.6	928	144.2	35.3	350	141.9	33.4	274	133.0	32.7
女性	1,742	142.6	35.0	83	115.8	28.9	188	124.1	32.9	230	132.0	32.6	275	150.0	33.9	399	154.6	34.5	567	144.9	32.6	1,286	147.6	34.7	457	151.4	33.4	345	141.2	31.0

注) 血清総コレステロール値及び血清 HDL コレステロール値の測定を行った 20 歳以上の者を集計対象とした。(30年)

※年齢調整した, 血清 nonHDL コレステロール値の平均値 (20 歳以上) は, 男性 141.4mg/dL, 女性 137.8mg/dL。
 年齢調整値は, 平成 22 年国勢調査による基準人口 (20-29 歳, 30-39 歳, 40-49 歳, 50-59 歳, 60-69 歳, 70 歳以上の 6 区分) を用いて算出した。

第 38 表の 3 血清 non HDL コレステロール値の分布－血清 non HDL コレステロール値の区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	993	100.0	52	100.0	102	100.0	142	100.0	131	100.0	235	100.0	331	100.0	748	100.0	270	100.0	203	100.0
70mg/dL未満	6	0.6	0	0.0	1	1.0	1	0.7	0	0.0	2	0.9	2	0.6	5	0.7	3	1.1	0	0.0
70-80未満	19	1.9	5	9.6	1	1.0	2	1.4	2	1.5	3	1.3	6	1.8	11	1.5	3	1.1	5	2.5
80-90未満	35	3.5	2	3.8	3	2.9	1	0.7	5	3.8	8	3.4	16	4.8	22	2.9	10	3.7	11	5.4
90-100未満	48	4.8	6	11.5	6	5.9	5	3.5	5	3.8	7	3.0	19	5.7	28	3.7	7	2.6	17	8.4
100-110未満	62	6.2	6	11.5	5	4.9	4	2.8	6	4.6	14	6.0	27	8.2	43	5.7	16	5.9	20	9.9
110-120未満	80	8.1	4	7.7	8	7.8	8	5.6	10	7.6	21	8.9	29	8.8	59	7.9	26	9.6	20	9.9
120-130未満	112	11.3	9	17.3	18	17.6	19	13.4	15	11.5	19	8.1	32	9.7	74	9.9	18	6.7	23	11.3
130-140未満	106	10.7	6	11.5	8	7.8	12	8.5	13	9.9	22	9.4	45	13.6	84	11.2	33	12.2	25	12.3
140-150未満	102	10.3	3	5.8	9	8.8	13	9.2	14	10.7	23	9.8	40	12.1	82	11.0	38	14.1	20	9.9
150-160未満	113	11.4	4	7.7	13	12.7	15	10.6	18	13.7	30	12.8	33	10.0	86	11.5	30	11.1	18	8.9
160-170未満	85	8.6	4	7.7	8	7.8	11	7.7	10	7.6	28	11.9	24	7.3	64	8.6	26	9.6	18	8.9
170-180未満	76	7.7	1	1.9	8	7.8	12	8.5	11	8.4	22	9.4	22	6.6	60	8.0	21	7.8	11	5.4
180-190未満	48	4.8	1	1.9	5	4.9	9	6.3	4	3.1	14	6.0	15	4.5	42	5.6	14	5.2	5	2.5
190-200未満	42	4.2	0	0.0	3	2.9	11	7.7	7	5.3	11	4.7	10	3.0	37	4.9	13	4.8	6	3.0
200-210未満	23	2.3	1	1.9	0	0.0	9	6.3	5	3.8	3	1.3	5	1.5	22	2.9	8	3.0	0	0.0
210-220未満	15	1.5	0	0.0	1	1.0	3	2.1	4	3.1	5	2.1	2	0.6	14	1.9	1	0.4	2	1.0
220mg/dL以上	21	2.1	0	0.0	5	4.9	7	4.9	2	1.5	3	1.3	4	1.2	15	2.0	3	1.1	2	1.0
女性	1,351	100.0	82	100.0	185	100.0	223	100.0	244	100.0	283	100.0	334	100.0	976	100.0	300	100.0	200	100.0
70mg/dL未満	11	0.8	3	3.7	4	2.2	2	0.9	2	0.8	0	0.0	0	0.0	4	0.4	0	0.0	0	0.0
70-80未満	27	2.0	5	6.1	9	4.9	8	3.6	4	1.6	0	0.0	1	0.3	13	1.3	1	0.3	0	0.0
80-90未満	32	2.4	8	9.8	8	4.3	9	4.0	1	0.4	2	0.7	4	1.2	15	1.5	4	1.3	2	1.0
90-100未満	47	3.5	9	11.0	16	8.6	11	4.9	3	1.2	2	0.7	6	1.8	20	2.0	3	1.0	4	2.0
100-110未満	107	7.9	12	14.6	24	13.0	25	11.2	15	6.1	5	1.8	26	7.8	57	5.8	8	2.7	20	10.0
110-120未満	142	10.5	9	11.0	39	21.1	30	13.5	27	11.1	17	6.0	20	6.0	84	8.6	14	4.7	15	7.5
120-130未満	138	10.2	12	14.6	20	10.8	30	13.5	20	8.2	30	10.6	26	7.8	96	9.8	23	7.7	17	8.5
130-140未満	151	11.2	7	8.5	18	9.7	22	9.9	21	8.6	40	14.1	43	12.9	106	10.9	40	13.3	31	15.5
140-150未満	150	11.1	8	9.8	12	6.5	28	12.6	29	11.9	36	12.7	37	11.1	115	11.8	32	10.7	26	13.0
150-160未満	114	8.4	5	6.1	11	5.9	15	6.7	25	10.2	27	9.5	31	9.3	93	9.5	29	9.7	20	10.0
160-170未満	121	9.0	1	1.2	6	3.2	17	7.6	25	10.2	28	9.9	44	13.2	103	10.6	43	14.3	20	10.0
170-180未満	89	6.6	1	1.2	6	3.2	7	3.1	19	7.8	27	9.5	29	8.7	76	7.8	29	9.7	16	8.0
180-190未満	77	5.7	1	1.2	6	3.2	7	3.1	25	10.2	19	6.7	19	5.7	67	6.9	25	8.3	6	3.0
190-200未満	52	3.8	0	0.0	2	1.1	5	2.2	9	3.7	15	5.3	21	6.3	44	4.5	20	6.7	9	4.5
200-210未満	31	2.3	0	0.0	1	0.5	3	1.3	6	2.5	12	4.2	9	2.7	27	2.8	9	3.0	6	3.0
210-220未満	19	1.4	0	0.0	0	0.0	2	0.9	5	2.0	5	1.8	7	2.1	17	1.7	6	2.0	4	2.0
220mg/dL以上	43	3.2	1	1.2	3	1.6	2	0.9	8	3.3	18	6.4	11	3.3	39	4.0	14	4.7	4	2.0

注) 血清総コレステロール値及び血清 HDL コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。(30年)

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dL)} = \text{総コレステロール (mg/dL)} - \text{HDLコレステロール (mg/dL)}$$

第 38 表の 4 血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20 歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差	人数	平均値:標準偏差
男性	993	143.4: 35.6	52	122.8: 30.7	102	143.6: 36.7	142	155.7: 38.5	131	146.9: 34.6	235	146.3: 34.9	331	137.9: 33.4	748	146.4: 35.5	270	144.0: 33.4	203	133.2: 32.3
女性	1,351	144.0: 36.4	82	115.8: 29.0	185	124.1: 33.1	223	131.5: 32.2	244	150.7: 34.7	283	158.7: 34.1	334	153.1: 34.4	976	150.4: 35.7	300	159.2: 33.8	200	147.5: 32.5

注) 血清総コレステロール値及び血清 HDL コレステロール値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した 20 歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第39表の1 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布—血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20mg/dL未満	43	3.6	8	15.4	7	6.8	4	2.7	5	3.1	5	1.7	14	3.2	7	2.0	12	4.4
20-49	204	17.0	13	25.0	21	20.4	15	10.3	23	14.4	36	11.9	96	21.8	51	14.6	68	24.8
50-79	237	19.7	18	34.6	16	15.5	31	21.2	26	16.3	68	22.5	78	17.7	72	20.6	48	17.5
80-109	184	15.3	4	7.7	13	12.6	35	24.0	27	16.9	51	16.9	54	12.3	53	15.1	33	12.0
110-139	129	10.7	6	11.5	11	10.7	8	5.5	20	12.5	34	11.3	50	11.4	39	11.1	30	10.9
140-169	115	9.6	0	0.0	7	6.8	18	12.3	20	12.5	26	8.6	44	10.0	37	10.6	23	8.4
170-199	291	24.2	3	5.8	28	27.2	35	24.0	39	24.4	82	27.2	104	23.6	91	26.0	60	21.9
200mg/dL以上	494	41.1	7	13.5	46	44.7	56	38.4	74	46.3	133	44.0	178	40.5	155	44.3	101	36.9
150以上(再掲)																		
女性	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20mg/dL未満	142	8.2	27	32.5	39	20.7	26	11.3	22	8.0	15	3.8	13	2.3	11	2.4	8	2.3
20-49	449	25.8	27	32.5	61	32.4	85	37.0	86	31.3	72	18.0	118	20.8	73	16.0	82	23.8
50-79	359	20.6	13	15.7	41	21.8	48	20.9	54	19.6	85	21.3	118	20.8	96	21.0	69	20.0
80-109	250	14.4	2	2.4	13	6.9	20	8.7	47	17.1	57	14.3	111	19.6	86	18.8	64	18.6
110-139	163	9.4	4	4.8	9	4.8	18	7.8	19	6.9	50	12.5	63	11.1	59	12.9	36	10.4
140-169	104	6.0	5	6.0	8	4.3	14	6.1	10	3.6	38	9.5	29	5.1	38	8.3	20	5.8
170-199	275	15.8	5	6.0	17	9.0	19	8.3	37	13.5	82	20.6	115	20.3	94	20.6	66	19.1
200mg/dL以上	483	27.7	14	16.9	31	16.5	48	20.9	60	21.8	154	38.6	176	31.0	167	36.5	107	31.0
150以上(再掲)																		

注) 血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第39表の2 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	161.0	120.0	52	99.0	64.0	103	182.3	195.5	146	165.5	109.7	160	177.4	155.3	302	169.8	107.1	440	149.7	93.1	350	162.9	100.5	274	141.1	87.1
女性	1,742	129.4	91.6	83	84.3	60.7	188	99.5	77.4	230	105.9	67.5	275	125.9	106.2	399	148.6	95.4	567	143.5	91.0	457	150.2	94.5	345	138.9	85.6

注) 血清中性脂肪（トリグリセライド）の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第39表の3 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布—血清中性脂肪（トリグリセライド）値の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	993	100.0	52	100.0	102	100.0	142	100.0	131	100.0	235	100.0	331	100.0	270	100.0	203	100.0
総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20mg/dL未満	39	3.9	8	15.4	7	6.9	4	2.8	4	3.1	4	1.7	12	3.6	6	2.2	10	4.9
20-49	187	18.8	13	25.0	21	20.6	15	10.6	22	16.8	34	14.5	82	24.8	48	17.8	56	27.6
50-79	199	20.0	18	34.6	15	14.7	31	21.8	21	16.0	57	24.3	57	17.2	55	20.4	36	17.7
80-109	159	16.0	4	7.7	13	12.7	34	23.9	21	16.0	39	16.6	48	14.5	42	15.6	30	14.8
110-139	100	10.1	6	11.5	11	10.8	8	5.6	17	13.0	24	10.2	34	10.3	29	10.7	18	8.9
140-169	89	9.0	0	0.0	7	6.9	17	12.0	15	11.5	19	8.1	31	9.4	28	10.4	15	7.4
170-199	220	22.2	3	5.8	28	27.5	33	23.2	31	23.7	58	24.7	67	20.2	62	23.0	38	18.7
200mg/dL以上	381	38.4	7	13.5	46	45.1	53	37.3	59	45.0	97	41.3	119	36.0	109	40.4	66	32.5
150以上(再掲)																		
女性	1,351	100.0	82	100.0	185	100.0	223	100.0	244	100.0	283	100.0	334	100.0	300	100.0	200	100.0
総数	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20mg/dL未満	131	9.7	26	31.7	39	21.1	24	10.8	21	8.6	10	3.5	11	3.3	9	3.0	6	3.0
20-49	376	27.8	27	32.9	59	31.9	84	37.7	76	31.1	58	20.5	72	21.6	50	16.7	50	25.0
50-79	281	20.8	13	15.9	41	22.2	48	21.5	50	20.5	64	22.6	65	19.5	60	20.0	35	17.5
80-109	184	13.6	2	2.4	13	7.0	20	9.0	43	17.6	40	14.1	66	19.8	53	17.7	40	20.0
110-139	118	8.7	4	4.9	8	4.3	18	8.1	17	7.0	33	11.7	38	11.4	40	13.3	20	10.0
140-169	72	5.3	5	6.1	8	4.3	14	6.3	7	2.9	26	9.2	12	3.6	24	8.0	9	4.5
170-199	189	14.0	5	6.1	17	9.2	15	6.7	30	12.3	52	18.4	70	21.0	64	21.3	40	20.0
200mg/dL以上	339	25.1	14	17.1	30	16.2	44	19.7	48	19.7	99	35.0	104	31.1	112	37.3	63	31.5
150以上(再掲)																		

注) 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第39表の4 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	993	156.0	120.8	52	99.0	64.0	102	183.0	196.4	142	164.3	110.4	131	170.0	150.7	235	161.8	103.4	331	143.4	93.3	270	154.7	95.4	203	135.2	88.2
女性	1,351	123.5	90.9	82	84.9	60.8	185	99.6	77.7	223	103.9	64.7	244	120.9	100.2	283	141.9	95.0	334	145.4	99.0	300	151.8	100.2	200	140.8	91.9

注) 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の測定を行い，身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第40表の1 血清クレアチニン値の分布—血清クレアチニン値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.50-0.59	13	1.1	0	0.0	1	1.0	1	0.7	1	0.6	3	1.0	7	1.6	4	1.1	5	1.8
	0.60-0.69	96	8.0	6	11.5	3	2.9	8	5.5	16	10.0	30	9.9	33	7.5	39	11.1	13	4.7
	0.70-0.79	260	21.6	11	21.2	33	32.0	36	24.7	37	23.1	68	22.5	75	17.0	72	20.6	44	16.1
	0.80-0.89	375	31.2	18	34.6	45	43.7	43	29.5	57	35.6	93	30.8	119	27.0	93	26.6	77	28.1
	0.90-0.99	235	19.5	14	26.9	15	14.6	41	28.1	36	22.5	49	16.2	80	18.2	66	18.9	44	16.1
	1.00-1.19	148	12.3	2	3.8	6	5.8	15	10.3	9	5.6	46	15.2	70	15.9	54	15.4	49	17.9
	1.20-1.39	40	3.3	1	1.9	0	0.0	1	0.7	3	1.9	7	2.3	28	6.4	15	4.3	19	6.9
	1.40-1.59	15	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	1.0	11	2.5	4	1.1	8	2.9
	1.60-1.79	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	6	1.4	0	0.0	6	2.2
	1.80-1.99	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	2	0.6	2	0.7
	2.00mg/dL以上	10	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	8	1.8	1	0.3	7	2.6
女性	総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
	0.40mg/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	0.40-0.49	83	4.8	8	9.6	18	9.6	10	4.3	12	4.4	15	3.8	20	3.5	17	3.7	11	3.2
	0.50-0.59	456	26.2	30	36.1	69	36.7	62	27.0	65	23.6	107	26.8	123	21.7	123	26.9	71	20.6
	0.60-0.69	678	38.9	38	45.8	74	39.4	98	42.6	133	48.4	153	38.3	182	32.1	161	35.2	101	29.3
	0.70-0.79	299	17.2	7	8.4	21	11.2	46	20.0	38	13.8	75	18.8	112	19.8	92	20.1	69	20.0
	0.80-0.89	128	7.3	0	0.0	5	2.7	11	4.8	20	7.3	29	7.3	63	11.1	38	8.3	41	11.9
	0.90-0.99	50	2.9	0	0.0	0	0.0	3	1.3	4	1.5	9	2.3	34	6.0	12	2.6	27	7.8
	1.00-1.19	28	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	8	2.0	18	3.2	7	1.5	16	4.6
	1.20-1.39	12	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	9	1.6	2	0.4	8	2.3
	1.40-1.59	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.4	0	0.0
	1.60-1.79	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3
	1.80-1.99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2.00mg/dL以上	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	3	0.5	3	0.7	0	0.0

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第40表の2 血清クレアチニン値の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	0.9	0.3	52	0.8	0.1	103	0.8	0.1	146	0.9	0.1	160	0.8	0.2	302	0.9	0.2	440	1.0	0.5	350	0.9	0.3	274	1.0	0.6
女性	1,742	0.7	0.2	83	0.6	0.1	188	0.6	0.1	230	0.6	0.1	275	0.7	0.2	399	0.7	0.2	567	0.7	0.4	457	0.7	0.4	345	0.7	0.2

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第41表の1 推算GFRの分布－推算GFRの区分，年齢階級別，人数，割合－男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.9	1	0.3	3	1.1
15-30未満	12	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.7	9	2.0	2	0.6	8	2.9
30-60未満	217	18.0	0	0.0	0	0.0	4	2.7	7	4.4	64	21.2	142	32.3	90	25.7	99	36.1
60-90未満	790	65.7	20	38.5	56	54.4	113	77.4	128	80	211	69.9	262	59.5	228	65.1	155	56.6
90ml/min/1.73m ² 以上	180	15.0	32	61.5	47	45.6	29	19.9	24	15	25	8.3	23	5.2	29	8.3	9	3.3
総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
15ml/min/1.73m ² 未満	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.4	2	0.4	0	0.0
15-30未満	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.1	3	0.7	3	0.9
30-60未満	299	17.2	0	0.0	2	1.1	5	2.2	27	9.8	74	18.5	191	33.7	92	20.1	144	41.7
60-90未満	1,104	63.4	15	18.1	85	45.2	174	75.7	204	74.2	283	70.9	343	60.5	322	70.5	188	54.5
90ml/min/1.73m ² 以上	329	18.9	68	81.9	101	53.7	51	22.2	43	15.6	41	10.3	25	4.4	38	8.3	10	2.9

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

$$\begin{aligned} \text{推算GFR (ml/min/1.73m}^2\text{)} &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dl)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \text{ (男性)} \\ &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dl)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \times 0.739 \text{ (女性)} \end{aligned}$$

注) CKDガイドライン2009年版の推算式

第41表の2 推算GFRの平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差	人数	平均値 標準偏差
男性	1,203	72.7 17.0	52	95.9 15.1	103	88.2 11.1	146	79.5 12.7	160	76.1 13.1	302	71.0 14.2	440	63.9 16.3	350	69.3 14.8	274	61.2 16.3
女性	1,742	75.0 18.0	83	103.6 15.8	188	93.2 15.9	230	81.3 12.8	275	76.1 13.9	399	71.4 13.7	567	64.3 14.9	457	69.3 14.1	345	62.4 14.7

注) 血清クレアチニン値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

$$\begin{aligned} \text{推算GFR (ml/min/1.73m}^2\text{)} &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dl)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \text{ (男性)} \\ &= 194 \times \text{血清クレアチニン値 (mg/dl)}^{-1.094} \times \text{年齢 (歳)}^{-0.287} \times 0.739 \text{ (女性)} \end{aligned}$$

注) CKDガイドライン2009年版の推算式

第 42 表の 1 血清鉄の分布—血清鉄の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総 数	1203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
	40 μ g/dL未満	35	2.9	1	1.9	1	1.0	2	1.4	0	0.0	5	1.7	26	5.9	12	3.4	19	6.9
	40-59	133	11.1	4	7.7	11	10.7	10	6.8	13	8.1	26	8.6	69	15.7	40	11.4	46	16.8
	60-79	270	22.4	9	17.3	27	26.2	27	18.5	29	18.1	73	24.2	105	23.9	81	23.1	69	25.2
	80-99	332	27.6	16	30.8	25	24.3	48	32.9	45	28.1	83	27.5	115	26.1	91	26.0	73	26.6
	100-119	180	15.0	13	25.0	12	11.7	26	17.8	28	17.5	42	13.9	59	13.4	53	15.1	33	12.0
	120-139	135	11.2	3	5.8	14	13.6	13	8.9	27	16.9	37	12.3	41	9.3	43	12.3	22	8.0
	140-159	56	4.7	3	5.8	7	6.8	9	6.2	9	5.6	14	4.6	14	3.2	17	4.9	6	2.2
	160-179	32	2.7	1	1.9	4	3.9	4	2.7	5	3.1	11	3.6	7	1.6	8	2.3	3	1.1
	180-199	19	1.6	1	1.9	2	1.9	5	3.4	4	2.5	5	1.7	2	0.5	3	0.9	1	0.4
	200 μ g/dL以上	11	0.9	1	1.9	0	0.0	2	1.4	0	0.0	6	2.0	2	0.5	2	0.6	2	0.7
女性	総 数	1742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
	40 μ g/dL未満	188	10.8	13	15.7	37	19.7	63	27.4	20	7.3	16	4.0	39	6.9	25	5.5	24	7.0
	40-59	373	21.4	14	16.9	48	25.5	34	14.8	60	21.8	85	21.3	132	23.3	112	24.5	73	21.2
	60-79	571	32.8	25	30.1	32	17.0	59	25.7	98	35.6	160	40.1	197	34.7	159	34.8	127	36.8
	80-99	337	19.3	17	20.5	24	12.8	40	17.4	54	19.6	78	19.5	124	21.9	93	20.4	75	21.7
	100-119	168	9.6	7	8.4	23	12.2	22	9.6	29	10.5	39	9.8	48	8.5	45	9.8	28	8.1
	120-139	67	3.8	2	2.4	14	7.4	6	2.6	7	2.5	18	4.5	20	3.5	19	4.2	14	4.1
	140-159	23	1.3	2	2.4	5	2.7	2	0.9	6	2.2	3	0.8	5	0.9	2	0.4	4	1.2
	160-179	4	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	180-199	4	0.2	0	0.0	2	1.1	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μ g/dL以上	7	0.4	3	3.6	2	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0

注) 血清鉄の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第 42 表の 2 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者含む]

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	93.7	35.5	52	100.1	39.1	103	95.9	35.2	146	100.5	36.1	160	100.5	32.3	302	97.7	37.1	440	85.0	33.2	350	92.2	33.9	274	82.0	32.6
女性	1,742	72.7	29.4	83	75.2	39.6	188	72.8	39.8	230	65.2	35.6	275	74.1	25.9	399	74.4	23.4	567	73.4	25.6	457	73.8	25.5	345	73.4	24.8

注) 血清鉄の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第 42 表の 3 血清鉄の分布—血清鉄の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総 数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総 数	1,192	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	300	100.0	431	100.0	347	100.0	266	100.0
	40 μ g/dL未満	33	2.8	1	1.9	1	1.0	2	1.4	0	0.0	5	1.7	24	5.6	11	3.2	18	6.8
	40-59	130	10.9	4	7.7	11	10.7	10	6.8	13	8.1	24	8.0	68	15.8	38	11.0	45	16.9
	60-79	268	22.5	9	17.3	27	26.2	27	18.5	29	18.1	73	24.3	103	23.9	81	23.3	67	25.2
	80-99	331	27.8	16	30.8	25	24.3	48	32.9	45	28.1	83	27.7	114	26.5	91	26.2	72	27.1
	100-119	178	14.9	13	25.0	12	11.7	26	17.8	28	17.5	42	14.0	57	13.2	53	15.3	31	11.7
	120-139	135	11.3	3	5.8	14	13.6	13	8.9	27	16.9	37	12.3	41	9.5	43	12.4	22	8.3
	140-159	56	4.7	3	5.8	7	6.8	9	6.2	9	5.6	14	4.7	14	3.2	17	4.9	6	2.3
	160-179	31	2.6	1	1.9	4	3.9	4	2.7	5	3.1	11	3.7	6	1.4	8	2.3	2	0.8
	180-199	19	1.6	1	1.9	2	1.9	5	3.4	4	2.5	5	1.7	2	0.5	3	0.9	1	0.4
	200 μ g/dL以上	11	0.9	1	1.9	0	0.0	2	1.4	0	0.0	6	2.0	2	0.5	2	0.6	2	0.8
女性	総 数	1,706	100.0	82	100.0	184	100.0	221	100.0	270	100.0	397	100.0	552	100.0	451	100.0	335	100.0
	40 μ g/dL未満	181	10.6	13	15.9	35	19.0	61	27.6	18	6.7	16	4.0	38	6.9	25	5.5	23	6.9
	40-59	367	21.5	14	17.1	47	25.5	32	14.5	59	21.9	84	21.2	131	23.7	111	24.6	73	21.8
	60-79	556	32.6	24	29.3	32	17.4	56	25.3	96	35.6	159	40.1	189	34.2	157	34.8	120	35.8
	80-99	333	19.5	17	20.7	24	13.0	39	17.6	54	20.0	78	19.6	121	21.9	92	20.4	73	21.8
	100-119	166	9.7	7	8.5	22	12.0	22	10.0	29	10.7	39	9.8	47	8.5	44	9.8	28	8.4
	120-139	67	3.9	2	2.4	14	7.6	6	2.7	7	2.6	18	4.5	20	3.6	19	4.2	14	4.2
	140-159	23	1.3	2	2.4	5	2.7	2	0.9	6	2.2	3	0.8	5	0.9	2	0.4	4	1.2
	160-179	4	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	180-199	4	0.2	0	0.0	2	1.1	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200 μ g/dL以上	5	0.3	3	3.7	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 血清鉄の測定を行い, 身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第 42 表の 4 血清鉄の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20 歳以上 [貧血治療のための薬の使用者除外]

	総 数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,192	93.9	35.4	52	100.1	39.1	103	95.9	35.2	146	100.5	36.1	160	100.5	32.3	300	98.0	37.0	431	85.1	33.0	347	92.6	33.7	266	81.8	32.4
女性	1,706	72.7	28.9	82	75.2	39.8	184	73.3	39.7	221	64.8	34.2	270	74.5	25.9	397	74.5	23.4	552	73.1	24.6	451	73.4	24.2	335	73.6	25.0

注) 血清鉄の測定を行い, 身体状況調査の問診において貧血治療のための薬(鉄剤)の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第43表の1 総鉄結合能（TIBC）の分布—総鉄結合能の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
総数	1203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
200μg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-249	29	2.4	0	0.0	3	2.9	1	0.7	1	0.6	4	1.3	20	4.5	8	2.3	16	5.8
250-299	299	24.9	11	21.2	17	16.5	16	11.0	24	15.0	73	24.2	158	35.9	110	31.4	96	35.0
300-349	523	43.5	24	46.2	57	55.3	73	50.0	81	50.6	127	42.1	161	36.6	148	42.3	98	35.8
350-399	280	23.3	16	30.8	23	22.3	46	31.5	49	30.6	72	23.8	74	16.8	60	17.1	46	16.8
400-449	58	4.8	1	1.9	3	2.9	10	6.8	4	2.5	19	6.3	21	4.8	21	6.0	13	4.7
450-499	11	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.0	5	1.1	2	0.6	5	1.8
500μg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
女性	1742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
総数	1742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
200μg/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.6
200-249	21	1.2	0	0.0	1	0.5	2	0.9	3	1.1	4	1.0	11	1.9	4	0.9	9	2.6
250-299	305	17.5	5	6.0	16	8.5	21	9.1	48	17.5	80	20.1	135	23.8	113	24.7	76	22.0
300-349	754	43.3	31	37.3	56	29.8	74	32.2	127	46.2	200	50.1	266	46.9	231	50.5	154	44.6
350-399	442	25.4	30	36.1	64	34.0	70	30.4	73	26.5	94	23.6	111	19.6	83	18.2	76	22.0
400-449	150	8.6	10	12.0	38	20.2	39	17.0	15	5.5	18	4.5	30	5.3	21	4.6	19	5.5
450-499	61	3.5	6	7.2	12	6.4	21	9.1	9	3.3	2	0.5	11	1.9	3	0.7	9	2.6
500μg/dL以上	7	0.4	1	1.2	1	0.5	3	1.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.4	0	0.0

注) 総鉄結合能（TIBC）の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第43表の2 総鉄結合能（TIBC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者含む〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1203	328.3	45.4	52	328.5	37.4	103	328.0	35.3	146	340.4	37.6	160	337.8	39.2	302	332.5	47.7	440	317.7	49.0	350	323.5	47.1	274	317.1	50.1
女性	1742	341.5	50.3	83	364.1	50.0	188	367.8	54.4	230	366.6	57.5	275	338.9	45.6	399	331.8	40.2	567	327.5	46.2	457	327.1	41.3	345	329.3	48.5

注) 総鉄結合能（TIBC）の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第43表の3 総鉄結合能（TIBC）の分布—総鉄結合能の区分，年齢階級別，人数，割合—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1192	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	300	100.0	431	100.0	347	100.0	266	100.0
総数	1192	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	300	100.0	431	100.0	347	100.0	266	100.0
200μg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-249	28	2.3	0	0.0	3	2.9	1	0.7	1	0.6	4	1.3	19	4.4	8	2.3	15	5.6
250-299	295	24.7	11	21.2	17	16.5	16	11.0	24	15.0	71	23.7	156	36.2	107	30.8	95	35.7
300-349	522	43.8	24	46.2	57	55.3	73	50.0	81	50.6	127	42.3	160	37.1	148	42.7	97	36.5
350-399	275	23.1	16	30.8	23	22.3	46	31.5	49	30.6	72	24.0	69	16.0	60	17.3	41	15.4
400-449	58	4.9	1	1.9	3	2.9	10	6.8	4	2.5	19	6.3	21	4.9	21	6.1	13	4.9
450-499	11	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.0	5	1.2	2	0.6	5	1.9
500μg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
女性	1706	100.0	82	100.0	184	100.0	221	100.0	270	100.0	397	100.0	552	100.0	451	100.0	335	100.0
総数	1706	100.0	82	100.0	184	100.0	221	100.0	270	100.0	397	100.0	552	100.0	451	100.0	335	100.0
200μg/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.6
200-249	17	1.0	0	0.0	1	0.5	2	0.9	3	1.1	4	1.0	7	1.3	3	0.7	6	1.8
250-299	293	17.2	5	6.1	15	8.2	20	9.0	45	16.7	79	19.9	129	23.4	111	24.6	71	21.2
300-349	749	43.9	31	37.8	56	30.4	73	33.0	126	46.7	199	50.1	264	47.8	229	50.8	154	46.0
350-399	431	25.3	29	35.4	62	33.7	65	29.4	72	26.7	94	23.7	109	19.7	83	18.4	74	22.1
400-449	146	8.6	10	12.2	37	20.1	37	16.7	15	5.6	18	4.5	29	5.3	20	4.4	19	5.7
450-499	61	3.6	6	7.3	12	6.5	21	9.5	9	3.3	2	0.5	11	2.0	3	0.7	9	2.7
500μg/dL以上	7	0.4	1	1.2	1	0.5	3	1.4	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.4	0	0.0

注) 総鉄結合能（TIBC）の測定を行い，身体状況調査の間診において貧血治療のための薬（鉄剤）の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第43表の4 総鉄結合能（TIBC）の平均値及び標準偏差—年齢階級別，人数，平均値，標準偏差—男性・女性，20歳以上〔貧血治療のための薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1192	328.5	45.3	52	328.5	37.4	103	328.0	35.3	146	340.4	37.6	160	337.8	39.2	300	332.8	47.6	431	317.6	48.8	347	323.9	47.1	266	316.8	49.8
女性	1706	341.9	50.0	82	363.9	50.2	184	368.1	54.6	221	366.6	58.0	270	339.5	45.3	397	331.9	40.1	552	328.3	45.6	451	327.3	40.8	335	330.6	48.1

注) 総鉄結合能（TIBC）の測定を行い，身体状況調査の間診において貧血治療のための薬（鉄剤）の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第44表の1 AST (GOT) の分布—AST (GOT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19	282	23.4	19	36.5	35	34.0	23	15.8	40	25.0	66	21.9	99	22.5	75	21.4	65	23.7
20-29	652	54.2	28	53.8	50	48.5	89	61.0	85	53.1	153	50.7	247	56.1	195	55.7	148	54.0
30-39	183	15.2	4	7.7	9	8.7	23	15.8	25	15.6	53	17.5	69	15.7	55	15.7	46	16.8
40-49	39	3.2	0	0.0	6	5.8	4	2.7	3	1.9	14	4.6	12	2.7	11	3.1	8	2.9
50IU/L以上	47	3.9	1	1.9	3	2.9	7	4.8	7	4.4	16	5.3	13	3.0	14	4.0	7	2.6
女性	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10-19	660	37.9	62	74.7	137	72.9	140	60.9	86	31.3	112	28.1	123	21.7	126	27.6	65	18.8
20-29	861	49.4	16	19.3	46	24.5	74	32.2	135	49.1	235	58.9	355	62.6	282	61.7	215	62.3
30-39	147	8.4	3	3.6	3	1.6	9	3.9	34	12.4	34	8.5	64	11.3	32	7.0	49	14.2
40-49	41	2.4	1	1.2	2	1.1	5	2.2	9	3.3	10	2.5	14	2.5	9	2.0	9	2.6
50IU/L以上	33	1.9	1	1.2	0	0.0	2	0.9	11	4.0	8	2.0	11	1.9	8	1.8	7	2.0

注) AST (GOT) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第44表の2 AST (GOT) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	26.0	12.1	52	22.2	7.6	103	24.5	9.3	146	26.3	9.9	160	26.3	16.0	302	27.3	14.4	440	25.6	10.3	350	26.0	10.4	274	25.6	10.2
女性	1,742	23.1	14.7	83	18.4	8.1	188	18.1	4.8	230	19.9	7.3	275	24.9	11.0	399	25.0	26.2	567	24.5	8.0	457	23.6	8.3	345	24.9	7.6

注) AST (GOT) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第45表の1 ALT (GPT) の分布—ALT (GPT) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合—男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
総数	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9	31	2.6	3	5.8	2	1.9	0	0.0	3	1.9	1	0.3	22	5.0	7	2.0	16	5.8
10-19	503	41.8	23	44.2	37	35.9	32	21.9	51	31.9	128	42.4	232	52.7	161	46.0	153	55.8
20-29	350	29.1	16	30.8	22	21.4	50	34.2	51	31.9	95	31.5	116	26.4	113	32.3	66	24.1
30-39	162	13.5	5	9.6	18	17.5	33	22.6	24	15.0	39	12.9	43	9.8	38	10.9	24	8.8
40-49	71	5.9	2	3.8	10	9.7	12	8.2	18	11.3	17	5.6	12	2.7	12	3.4	9	3.3
50IU/L以上	86	7.1	3	5.8	14	13.6	19	13.0	13	8.1	22	7.3	15	3.4	19	5.4	6	2.2
女性	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
総数	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
5IU/L未満	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5-9	117	6.7	25	30.1	27	14.4	28	12.2	6	2.2	7	1.8	24	4.2	7	1.5	19	5.5
10-19	1,048	60.2	43	51.8	128	68.1	148	64.3	147	53.5	227	56.9	355	62.6	276	60.4	222	64.3
20-29	391	22.4	6	7.2	27	14.4	40	17.4	64	23.3	115	28.8	139	24.5	132	28.9	73	21.2
30-39	97	5.6	3	3.6	2	1.1	6	2.6	31	11.3	25	6.3	30	5.3	25	5.5	19	5.5
40-49	32	1.8	2	2.4	0	0.0	1	0.4	13	4.7	8	2.0	8	1.4	5	1.1	7	2.0
50IU/L以上	55	3.2	4	4.8	3	1.6	7	3.0	14	5.1	16	4.0	11	1.9	12	2.6	5	1.4

注) ALT (GPT) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第45表の2 ALT (GPT) の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 20歳以上

(IU/L)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	26.0	18.2	52	24.3	19.1	103	30.8	20.9	146	33.1	20.7	160	30.0	26.2	302	26.1	16.1	440	21.1	12.1	350	23.7	14.3	274	20.1	10.0
女性	1,742	19.7	23.3	83	16.6	17.0	188	14.9	8.1	230	17.3	11.9	275	22.6	13.1	399	23.3	44.0	567	18.8	9.3	457	19.8	10.5	345	18.3	8.5

注) ALT (GPT) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

(30年)

第46表の1 γ -GT (γ -GTP) の分布 - γ -GT (γ -GTP) の区分, 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
総数	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10IU/L未満	252	20.9	23	44.2	31	30.1	21	14.4	20	12.5	49	16.2	108	24.5	66	18.9	77	28.1
10-19	321	26.7	18	34.6	29	28.2	36	24.7	33	20.6	69	22.8	136	30.9	90	25.7	90	32.8
20-29	177	14.7	2	3.8	8	7.8	21	14.4	30	18.8	50	16.6	66	15.0	67	19.1	35	12.8
30-39	119	9.9	2	3.8	11	10.7	21	14.4	17	10.6	28	9.3	40	9.1	28	8.0	26	9.5
40-49	81	6.7	2	3.8	5	4.9	9	6.2	9	5.6	26	8.6	30	6.8	26	7.4	19	6.9
50-59	47	3.9	3	5.8	5	4.9	6	4.1	12	7.5	8	2.6	13	3.0	14	4.0	3	1.1
60-69	46	3.8	1	1.9	2	1.9	7	4.8	8	5.0	15	5.0	13	3.0	16	4.6	9	3.3
70-79	158	13.1	1	1.9	12	11.7	24	16.4	31	19.4	56	18.5	34	7.7	43	12.3	15	5.5
80IU/L以上																		
女性	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
総数	46	2.6	6	7.2	14	7.4	10	4.3	3	1.1	4	1.0	9	1.6	4	0.9	8	2.3
10IU/L未満	951	54.6	62	74.7	133	70.7	133	57.8	131	47.6	188	47.1	304	53.6	234	51.2	186	53.9
10-19	419	24.1	10	12.0	28	14.9	52	22.6	58	21.1	110	27.6	161	28.4	124	27.1	98	28.4
20-29	125	7.2	2	2.4	4	2.1	10	4.3	20	7.3	40	10.0	49	8.6	47	10.3	25	7.2
30-39	68	3.9	0	0.0	5	2.7	7	3.0	20	7.3	22	5.5	14	2.5	16	3.5	12	3.5
40-49	38	2.2	3	3.6	3	1.6	5	2.2	6	2.2	10	2.5	11	1.9	14	3.1	5	1.4
50-59	25	1.4	0	0.0	1	0.5	4	1.7	7	2.5	8	2.0	5	0.9	5	1.1	3	0.9
60-69	19	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	4.4	2	0.5	5	0.9	1	0.2	4	1.2
70-79	51	2.9	0	0.0	0	0.0	9	3.9	18	6.5	15	3.8	9	1.6	12	2.6	4	1.2
80IU/L以上																		

注) γ -GT (γ -GTP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第46表の2 γ -GT (γ -GTP) の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	48.0	55.3	52	26.7	17.6	103	41.3	39.2	146	54.0	56.0	160	56.9	55.5	302	57.2	60.4	440	40.5	55.8	350	46.0	43.5	274	38.6	63.3
女性	1,742	25.3	31.4	83	16.3	9.1	188	16.8	9.1	230	23.8	26.3	275	37.5	64.1	399	27.2	22.6	567	22.9	15.8	457	24.8	19.6	345	22.4	14.4

注) γ -GT (γ -GTP) の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第47表の1 血清尿酸値の分布 - 血清尿酸値の区分, 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	1,203	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	302	100.0	440	100.0	350	100.0	274	100.0
総数	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.6	0	0.0
2.0mg/dL未満	9	0.7	0	0.0	1	1.0	1	0.7	2	1.3	1	0.3	4	0.9	2	0.6	3	1.1
2.0-2.9	61	5.1	1	1.9	5	4.9	5	3.4	8	5.0	19	6.3	23	5.2	20	5.7	18	6.6
3.0-3.9	206	17.1	7	13.5	15	14.6	17	11.6	24	15.0	51	16.9	92	20.9	66	18.9	60	21.9
4.0-4.9	394	32.8	22	42.3	29	28.2	43	29.5	46	28.8	95	31.5	159	36.1	121	34.6	88	32.1
5.0-5.9	328	27.3	16	30.8	32	31.1	46	31.5	56	35.0	81	26.8	97	22.0	87	24.9	62	22.6
6.0-6.9	146	12.1	5	9.6	15	14.6	25	17.1	14	8.8	38	12.6	49	11.1	40	11.4	31	11.3
7.0-7.9	49	4.1	1	1.9	5	4.9	8	5.5	10	6.3	11	3.6	14	3.2	9	2.6	11	4.0
8.0-8.9	5	0.4	0	0.0	1	1.0	1	0.7	0	0.0	2	0.7	1	0.2	1	0.3	0	0.0
9.0-9.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.2	2	0.6	1	0.4
10mg/dL以上																		
女性	1,742	100.0	83	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	399	100.0	567	100.0	457	100.0	345	100.0
総数	8	0.5	1	1.2	2	1.1	0	0.0	2	0.7	2	0.5	1	0.2	2	0.4	1	0.3
2.0mg/dL未満	84	4.8	6	7.2	17	9.0	23	10.0	10	3.6	14	3.5	14	2.5	14	3.1	9	2.6
2.0-2.9	413	23.7	21	25.3	69	36.7	78	33.9	65	23.6	75	18.8	105	18.5	94	20.6	59	17.1
3.0-3.9	684	39.3	36	43.4	76	40.4	92	40.0	103	37.5	175	43.9	202	35.6	191	41.8	116	33.6
4.0-4.9	371	21.3	18	21.7	19	10.1	28	12.2	64	23.3	91	22.8	151	26.6	110	24.1	94	27.2
5.0-5.9	147	8.4	0	0.0	5	2.7	9	3.9	25	9.1	32	8.0	76	13.4	40	8.8	51	14.8
6.0-6.9	30	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.2	8	2.0	16	2.8	6	1.3	13	3.8
7.0-7.9	4	0.2	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	2	0.6
8.0-8.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.0-9.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10mg/dL以上																		

注) 血清尿酸値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第47表の2 血清尿酸値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲)65-74歳			(再掲)75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	1,203	5.8	1.3	52	5.8	1.0	103	5.9	1.3	146	6.1	1.2	160	5.9	1.2	302	5.8	1.4	440	5.7	1.3	350	5.7	1.3	274	5.7	1.4
女性	1,742	4.6	1.1	83	4.3	1.0	188	4.1	0.9	230	4.1	0.9	275	4.6	1.1	399	4.7	1.0	567	4.9	1.1	457	4.6	1.0	345	4.9	1.2

注) 血清尿酸値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。(30年)

第48表 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況－メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の疑い、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%									
総数	2,903	100.0	128	100.0	281	100.0	373	100.0	434	100.0	696	100.0	991	100.0	1,889	100.0	802	100.0	605	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	567	19.5	1	0.8	5	1.8	23	6.2	76	17.5	172	24.7	290	29.3	390	20.6	224	27.9	171	28.3
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	421	14.5	3	2.3	27	9.6	63	16.9	63	14.5	113	16.2	152	15.3	289	15.3	114	14.2	102	16.9
上記以外	1,915	66.0	124	96.9	249	88.6	287	76.9	295	68.0	411	59.1	549	55.4	1,210	64.1	464	57.9	332	54.9
総数	1,196	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	160	100.0	301	100.0	436	100.0	772	100.0	348	100.0	271	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	364	30.4	0	0.0	5	4.9	18	12.3	51	31.9	115	38.2	175	40.1	249	32.3	135	38.8	110	40.6
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	289	24.2	3	5.9	24	23.5	47	32.2	36	22.5	74	24.6	105	24.1	192	24.9	78	22.4	70	25.8
上記以外	543	45.4	48	94.1	73	71.6	81	55.5	73	45.6	112	37.2	156	35.8	331	42.9	135	38.8	91	33.6
総数	1,707	100.0	77	100.0	179	100.0	227	100.0	274	100.0	395	100.0	555	100.0	1,117	100.0	454	100.0	334	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	203	11.9	1	1.3	0	0.0	5	2.2	25	9.1	57	14.4	115	20.7	141	12.6	89	19.6	61	18.3
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	132	7.7	0	0.0	3	1.7	16	7.0	27	9.9	39	9.9	47	8.5	97	8.7	36	7.9	32	9.6
上記以外	1,372	80.4	76	98.7	176	98.3	206	90.7	222	81.0	299	75.7	393	70.8	879	78.7	329	72.5	241	72.2

注1) 血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、コレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答し、かつインスリン注射または血糖を下げる薬を有効回答とみなした20歳以上の者を集計対象とした。なお、女性は妊婦5名を除外した。

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定はp.6参照。

注3) 「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い」の判定基準はp.15参照。

(30年)

第49表の1 腹囲区分別, 血中脂質, 血圧, 血糖のいずれかのリスクを有する割合—年齢階級, 腹囲の区分, 血中脂質・血圧・血糖のリスク保有数別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲(cm)	総数		リスク保有数								
		人数	%	0		1つ		2つ		3つ		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	<85cm(男)/90cm(女)	1,780	100.0	715	40.2	647	36.3	303	17.0	115	6.5	
		1,123	100.0	135	12.0	421	37.5	360	32.1	207	18.4	
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	114	100.0	101	88.6	11	9.6	2	1.8	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	14	100.0	10	71.4	3	21.4	1	7.1	0	0.0
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	216	100.0	182	84.3	29	13.4	5	2.3	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	65	100.0	33	50.8	27	41.5	5	7.7	0	0.0
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	259	100.0	178	68.7	74	28.6	7	2.7	0	0.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	114	100.0	28	24.6	63	55.3	21	18.4	2	1.8
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	278	100.0	125	45.0	120	43.2	27	9.7	6	2.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	156	100.0	17	10.9	63	40.4	55	35.3	21	13.5
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	387	100.0	82	21.2	189	48.8	88	22.7	28	7.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	309	100.0	24	7.8	113	36.6	110	35.6	62	20.1
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	526	100.0	47	8.9	224	42.6	174	33.1	81	15.4
		≥85cm(男)/90cm(女)	465	100.0	23	4.9	152	32.7	168	36.1	122	26.2
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,133	100.0	410	36.2	473	41.7	187	16.5	63	5.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	756	100.0	77	10.2	289	38.2	250	33.1	140	18.5
(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	443	100.0	70	15.8	204	46.0	122	27.5	47	10.6	
	≥85cm(男)/90cm(女)	359	100.0	21	5.8	114	31.8	129	35.9	95	26.5	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	317	100.0	22	6.9	134	42.3	109	34.4	52	16.4	
	≥85cm(男)/90cm(女)	288	100.0	15	5.2	102	35.4	104	36.1	67	23.3	
男性	<85cm	462	100.0	151	32.7	209	45.2	84	18.2	18	3.9	
		734	100.0	81	11.0	289	39.4	236	32.2	128	17.4	
	20-29歳	<85cm	43	100.0	34	79.1	8	18.6	1	2.3	0	0.0
		≥85cm	8	100.0	5	62.5	3	37.5	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	<85cm	53	100.0	40	75.5	12	22.6	1	1.9	0	0.0
		≥85cm	49	100.0	20	40.8	24	49.0	5	10.2	0	0.0
	40-49歳	<85cm	62	100.0	31	50.0	28	45.2	3	4.8	0	0.0
		≥85cm	84	100.0	19	22.6	47	56.0	17	20.2	1	1.2
	50-59歳	<85cm	61	100.0	21	34.4	28	45.9	10	16.4	2	3.3
		≥85cm	99	100.0	12	12.1	36	36.4	36	36.4	15	15.2
	60-69歳	<85cm	98	100.0	10	10.2	60	61.2	25	25.5	3	3.1
		≥85cm	203	100.0	14	6.9	74	36.5	75	36.9	40	19.7
	70歳以上	<85cm	145	100.0	15	10.3	73	50.3	44	30.3	13	9.0
		≥85cm	291	100.0	11	3.8	105	36.1	103	35.4	72	24.7
	(再掲) 40-74歳	<85cm	282	100.0	69	24.5	148	52.5	55	19.5	10	3.5
		≥85cm	490	100.0	49	10.0	192	39.2	162	33.1	87	17.8
(再掲) 65-74歳	<85cm	124	100.0	13	10.5	67	54.0	37	29.8	7	5.6	
	≥85cm	224	100.0	11	4.9	78	34.8	75	33.5	60	26.8	
(再掲) 75歳以上	<85cm	84	100.0	8	9.5	41	48.8	27	32.1	8	9.5	
	≥85cm	187	100.0	7	3.7	70	37.4	69	36.9	41	21.9	
女性	<90cm	1,318	100.0	564	42.8	438	33.2	219	16.6	97	7.4	
		389	100.0	54	13.9	132	33.9	124	31.9	79	20.3	
	20-29歳	<90cm	71	100.0	67	94.4	3	4.2	1	1.4	0	0.0
		≥90cm	6	100.0	5	83.3	0	0.0	1	16.7	0	0.0
	30-39歳	<90cm	163	100.0	142	87.1	17	10.4	4	2.5	0	0.0
		≥90cm	16	100.0	13	81.3	3	18.8	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	<90cm	197	100.0	147	74.6	46	23.4	4	2.0	0	0.0
		≥90cm	30	100.0	9	30.0	16	53.3	4	13.3	1	3.3
	50-59歳	<90cm	217	100.0	104	47.9	92	42.4	17	7.8	4	1.8
		≥90cm	57	100.0	5	8.8	27	47.4	19	33.3	6	10.5
	60-69歳	<90cm	289	100.0	72	24.9	129	44.6	63	21.8	25	8.7
		≥90cm	106	100.0	10	9.4	39	36.8	35	33.0	22	20.8
	70歳以上	<90cm	381	100.0	32	8.4	151	39.6	130	34.1	68	17.8
		≥90cm	174	100.0	12	6.9	47	27.0	65	37.4	50	28.7
	(再掲) 40-74歳	<90cm	851	100.0	341	40.1	325	38.2	132	15.5	53	6.2
		≥90cm	266	100.0	28	10.5	97	36.5	88	33.1	53	19.9
(再掲) 65-74歳	<90cm	319	100.0	57	17.9	137	42.9	85	26.6	40	12.5	
	≥90cm	135	100.0	10	7.4	36	26.7	54	40.0	35	25.9	
(再掲) 75歳以上	<90cm	233	100.0	14	6.0	93	39.9	82	35.2	44	18.9	
	≥90cm	101	100.0	8	7.9	32	31.7	35	34.7	26	25.7	

注1) 血圧, 腹囲, ヘモグロビンA1c, 血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診において血圧を下げる薬, コレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況に回答し, かつインスリン注射または血糖を下げる薬を有効回答とみなした20歳以上の者を集計対象とした。なお, 女性は妊婦5名を除外した。(30年)

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定はp.6参照。

注3) リスクの項目の基準はp.16参照。

第 49 表の 2 腹囲区分別, 血中脂質, 血圧, 血糖のリスクの保有状況〔すべての組合せ (①血中脂質②血圧③血糖)〕一年齢階級, 腹囲の区分, 血中脂質・血圧・血糖のリスク保有組合せ別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 20 歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲 (cm)	総 数		リスク保有組合せ																
		人数	%	①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①有②無③無		①無②有③無		①無②無③有		①無②無③無		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総 数	<85cm(男)/90cm(女)	1,780	100.0	115	6.5	125	7.0	153	8.6	25	1.4	64	3.6	504	28.3	79	4.4	715	40.2	
	≥85cm(男)/90cm(女)	1,123	100.0	207	18.4	142	12.6	206	18.3	12	1.1	19	1.7	364	32.4	38	3.4	135	12.0	
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	114	100.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	1	0.9	9	7.9	1	0.9	101	88.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	14	100.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	0	0.0	10	71.4
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	216	100.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9	1	0.5	5	2.3	18	8.3	6	2.8	182	84.3
		≥85cm(男)/90cm(女)	65	100.0	0	0.0	3	4.6	2	3.1	0	0.0	4	6.2	21	32.3	2	3.1	33	50.8
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	259	100.0	0	0.0	3	1.2	2	0.8	2	0.8	8	3.1	55	21.2	11	4.2	178	68.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	114	100.0	2	1.8	7	6.1	14	12.3	0	0.0	4	3.5	50	43.9	9	7.9	28	24.6
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	278	100.0	6	2.2	11	4.0	14	5.0	2	0.7	10	3.6	96	34.5	14	5.0	125	45.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	156	100.0	21	13.5	17	10.9	34	21.8	4	2.6	2	1.3	56	35.9	5	3.2	17	10.9
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	387	100.0	28	7.2	34	8.8	43	11.1	11	2.8	20	5.2	140	36.2	29	7.5	82	21.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	309	100.0	62	20.1	41	13.3	65	21.0	4	1.3	3	1.0	102	33.0	8	2.6	24	7.8
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	526	100.0	81	15.4	74	14.1	91	17.3	9	1.7	20	3.8	186	35.4	18	3.4	47	8.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	465	100.0	122	26.2	73	15.7	91	19.6	4	0.9	6	1.3	132	28.4	14	3.0	23	4.9
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	1,133	100.0	63	5.6	70	6.2	95	8.4	22	1.9	47	4.1	365	32.2	61	5.4	410	36.2
(再掲) 65-74歳	≥85cm(男)/90cm(女)	756	100.0	140	18.5	91	12.0	148	19.6	11	1.5	10	1.3	252	33.3	27	3.6	77	10.2	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	443	100.0	47	10.6	41	9.3	68	15.3	13	2.9	21	4.7	158	35.7	25	5.6	70	15.8	
	≥85cm(男)/90cm(女)	359	100.0	95	26.5	52	14.5	71	19.8	6	1.7	3	0.8	101	28.1	10	2.8	21	5.8	
男 性	<85cm	462	100.0	18	3.9	26	5.6	52	11.3	6	1.3	16	3.5	174	37.7	19	4.1	151	32.7	
	≥85cm	734	100.0	128	17.4	82	11.2	144	19.6	10	1.4	10	1.4	261	35.6	18	2.5	81	11.0	
	20-29歳	<85cm	43	100.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	7	16.3	0	0.0	34	79.1
		≥85cm	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	5	62.5
	30-39歳	<85cm	53	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	4	7.5	7	13.2	1	1.9	40	75.5
		≥85cm	49	100.0	0	0.0	3	6.1	2	4.1	0	0.0	4	8.2	19	38.8	1	2.0	20	40.8
	40-49歳	<85cm	62	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	3.2	3	4.8	23	37.1	2	3.2	31	50.0
		≥85cm	84	100.0	1	1.2	6	7.1	11	13.1	0	0.0	2	2.4	43	51.2	2	2.4	19	22.6
	50-59歳	<85cm	61	100.0	2	3.3	6	9.8	3	4.9	1	1.6	0	0.0	25	41.0	3	4.9	21	34.4
		≥85cm	99	100.0	15	15.2	12	12.1	20	20.2	4	4.0	0	0.0	35	35.4	1	1.0	12	12.1
	60-69歳	<85cm	98	100.0	3	3.1	8	8.2	16	16.3	1	1.0	5	5.1	50	51.0	5	5.1	10	10.2
		≥85cm	203	100.0	40	19.7	23	11.3	49	24.1	3	1.5	2	1.0	70	34.5	2	1.0	14	6.9
	70歳以上	<85cm	145	100.0	13	9.0	11	7.6	31	21.4	2	1.4	3	2.1	62	42.8	8	5.5	15	10.3
		≥85cm	291	100.0	72	24.7	38	13.1	62	21.3	3	1.0	2	0.7	91	31.3	12	4.1	11	3.8
	(再掲) 40-74歳	<85cm	282	100.0	10	3.5	18	6.4	32	11.3	5	1.8	10	3.5	124	44.0	14	5.0	69	24.5
(再掲) 65-74歳	≥85cm	490	100.0	87	17.8	51	10.4	101	20.6	10	2.0	4	0.8	179	36.5	9	1.8	49	10.0	
(再掲) 75歳以上	<85cm	124	100.0	7	5.6	8	6.5	27	21.8	2	1.6	5	4.0	54	43.5	8	6.5	13	10.5	
	≥85cm	224	100.0	60	26.8	23	10.3	47	21.0	5	2.2	1	0.4	72	32.1	5	2.2	11	4.9	
女 性	<90cm	1,318	100.0	97	7.4	99	7.5	101	7.7	19	1.4	48	3.6	330	25.0	60	4.6	564	42.8	
	≥90cm	389	100.0	79	20.3	60	15.4	62	15.9	2	0.5	9	2.3	103	26.5	20	5.1	54	13.9	
	20-29歳	<90cm	71	100.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	2.8	1	1.4	67	94.4
		≥90cm	6	100.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	83.3
	30-39歳	<90cm	163	100.0	0	0.0	2	1.2	1	0.6	1	0.6	1	0.6	11	6.7	5	3.1	142	87.1
		≥90cm	16	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	6.3	13	81.3
	40-49歳	<90cm	197	100.0	0	0.0	3	1.5	1	0.5	0	0.0	5	2.5	32	16.2	9	4.6	147	74.6
		≥90cm	30	100.0	1	3.3	1	3.3	3	10.0	0	0.0	2	6.7	7	23.3	7	23.3	9	30.0
	50-59歳	<90cm	217	100.0	4	1.8	5	2.3	11	5.1	1	0.5	10	4.6	71	32.7	11	5.1	104	47.9
		≥90cm	57	100.0	6	10.5	5	8.8	14	24.6	0	0.0	2	3.5	21	36.8	4	7.0	5	8.8
	60-69歳	<90cm	289	100.0	25	8.7	26	9.0	27	9.3	10	3.5	15	5.2	90	31.1	24	8.3	72	24.9
		≥90cm	106	100.0	22	20.8	18	17.0	16	15.1	1	0.9	1	0.9	32	30.2	6	5.7	10	9.4
	70歳以上	<90cm	381	100.0	68	17.8	63	16.5	60	15.7	7	1.8	17	4.5	124	32.5	10	2.6	32	8.4
		≥90cm	174	100.0	50	28.7	35	20.1	29	16.7	1	0.6	4	2.3	41	23.6	2	1.1	12	6.9
	(再掲) 40-74歳	<90cm	851	100.0	53	6.2	52	6.1	63	7.4	17	2.0	37	4.3	241	28.3	47	5.5	341	40.1
(再掲) 65-74歳	≥90cm	266	100.0	53	19.9	40	15.0	47	17.7	1	0.4	6	2.3	73	27.4	18	6.8	28	10.5	
(再掲) 75歳以上	<90cm	319	100.0	40	12.5	33	10.3	41	12.9	11	3.4	16	5.0	104	32.6	17	5.3	57	17.9	
	≥90cm	135	100.0	35	25.9	29	21.5	24	17.8	1	0.7	2	1.5	29	21.5	5	3.7	10	7.4	
(再掲) 75歳以上	<90cm	233	100.0	44	18.9	45	19.3	36	15.5	1	0.4	10	4.3	76	32.6	7	3.0	14	6.0	
	≥90cm	101	100.0	26	25.7	19	18.8	15	14.9	1	1.0	3	3.0	28	27.7	1	1.0	8	7.9	

注 1) 血圧, 腹囲, ヘモグロビン A1c, 血清 HDL コレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診において血圧を下げる薬, コレステロールを下げる薬及び中性脂肪 (トリグリセライド) を下げる薬の服用状況に回答し, かつインスリン注射または血糖を下げる薬について有効回答とみなした 20 歳以上の者を集計対象とした。なお, 女性は妊婦 5 名を除外した。 (30年)

注 2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定は p. 6 参照。

注 3) リスクの項目の基準は p.16 参照。

第50表 糖尿病の指摘の状況－糖尿病の指摘の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	2,930	100.0	131	100.0	290	100.0	373	100.0	435	100.0	702	100.0	999	100.0	1,897	100.0	807	100.0	612	100.0
あり	414	14.1	2	1.5	8	2.8	24	6.4	53	12.2	128	18.2	199	19.9	285	15.0	163	20.2	119	19.4
なし	2,516	85.9	129	98.5	282	97.2	349	93.6	382	87.8	574	81.8	800	80.1	1,612	85.0	644	79.8	493	80.6
総数	1,201	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	302	100.0	439	100.0	774	100.0	349	100.0	274	100.0
男性	238	19.8	1	2.0	1	1.0	14	9.6	39	24.2	75	24.8	108	24.6	175	22.6	94	26.9	61	22.3
なし	963	80.2	50	98.0	101	99.0	132	90.4	122	75.8	227	75.2	331	75.4	599	77.4	255	73.1	213	77.7
総数	1,729	100.0	80	100.0	188	100.0	227	100.0	274	100.0	400	100.0	560	100.0	1,123	100.0	458	100.0	338	100.0
あり	176	10.2	1	1.3	7	3.7	10	4.4	14	5.1	53	13.3	91	16.3	110	9.8	69	15.1	58	17.2
なし	1,553	89.8	79	98.8	181	96.3	217	95.6	260	94.9	347	86.8	469	83.8	1,013	90.2	389	84.9	280	82.8

注) ヘモグロビンA1c値を測定し，身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7-1) 現在糖尿病治療の有無」及び「(7-2) 現在の状況」が有効回答の者を集計対象とした。(30年)

第51表 糖尿病を指摘されたことがある者における，治療の状況－治療の有無，年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	414	100.0	2	100.0	8	100.0	24	100.0	53	100.0	128	100.0	199	100.0	285	100.0	163	100.0	119	100.0
あり	269	65.0	0	0.0	1	12.5	10	41.7	30	56.6	86	67.2	142	71.4	178	62.5	109	66.9	90	75.6
なし	145	35.0	2	100.0	7	87.5	14	58.3	23	43.4	42	32.8	57	28.6	107	37.5	54	33.1	29	24.4
総数	238	100.0	1	100.0	1	100.0	14	100.0	39	100.0	75	100.0	108	100.0	175	100.0	94	100.0	61	100.0
男性	166	69.7	0	0.0	1	100.0	7	50.0	23	59.0	54	72.0	81	75.0	116	66.3	68	72.3	49	80.3
なし	72	30.3	1	100.0	0	0.0	7	50.0	16	41.0	21	28.0	27	25.0	59	33.7	26	27.7	12	19.7
総数	176	100.0	1	100.0	7	100.0	10	100.0	14	100.0	53	100.0	91	100.0	110	100.0	69	100.0	58	100.0
あり	103	58.5	0	0.0	0	0.0	3	30.0	7	50.0	32	60.4	61	67.0	62	56.4	41	59.4	41	70.7
なし	73	41.5	1	100.0	7	100.0	7	70.0	7	50.0	21	39.6	30	33.0	48	43.6	28	40.6	17	29.3

注1) ヘモグロビンA1c値を測定し，身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」，「(7-1) 現在糖尿病治療の有無」及び「(7-2) 現在の状況」が有効回答の者のうち，「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。(30年)

第52表 現在、糖尿病治療をしている者における治療の状況—治療の状況—年齢級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	269	100.0	0	0.0	1	100.0	10	100.0	30	100.0	86	100.0	142	100.0	178	100.0	109	100.0	90	100.0
インスリン注射または 血糖を下げる薬	187	69.5	0	0.0	0	0.0	8	80.0	21	70.0	63	73.3	95	66.9	133	74.7	84	77.1	54	60.0
なし	82	30.5	0	0.0	1	100.0	2	20.0	9	30.0	23	26.7	47	33.1	45	25.3	25	22.9	36	40.0
通院により定期的な検査 や生活習慣の改善指導	180	66.9	0	0.0	1	100.0	9	90.0	22	73.3	54	62.8	94	66.2	117	65.7	66	60.6	62	68.9
なし	89	33.1	0	0.0	0	0.0	1	10.0	8	26.7	32	37.2	48	33.8	61	34.3	43	39.4	28	31.1
総数	166	100.0	0	0.0	1	100.0	7	100.0	23	100.0	54	100.0	81	100.0	116	100.0	68	100.0	49	100.0
男性	122	73.5	0	0.0	0	0.0	6	85.7	18	78.3	41	75.9	57	70.4	93	80.2	57	83.8	29	59.2
インスリン注射または 血糖を下げる薬	44	26.5	0	0.0	1	100.0	1	14.3	5	21.7	13	24.1	24	29.6	23	19.8	11	16.2	20	40.8
なし	106	63.9	0	0.0	1	100.0	7	100.0	15	65.2	34	63.0	49	60.5	74	63.8	40	58.8	31	63.3
通院により定期的な検査 や生活習慣の改善指導	60	36.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	34.8	20	37.0	32	39.5	42	36.2	28	41.2	18	36.7
なし	103	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	7	100.0	32	100.0	61	100.0	62	100.0	41	100.0	41	100.0
女性	65	63.1	0	0.0	0	0.0	2	66.7	3	42.9	22	68.8	38	62.3	40	64.5	27	65.9	25	61.0
インスリン注射または 血糖を下げる薬	38	36.9	0	0.0	0	0.0	1	33.3	4	57.1	10	31.3	23	37.7	22	35.5	14	34.1	16	39.0
なし	74	71.8	0	0.0	0	0.0	2	66.7	7	100.0	20	62.5	45	73.8	43	69.4	26	63.4	31	75.6
通院により定期的な検査 や生活習慣の改善指導	29	28.2	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	12	37.5	16	26.2	19	30.6	15	36.6	10	24.4
なし	46	44.9	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	10	31.3	27	42.3	23	36.2	11	31.8	21	47.8

注1) ヘモグロビンA1c値を測定し、身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1) 現在糖尿病治療の有無」、及び「(7-2) 現在の状況」が有効回答の者のうち、「(7-1) 現在糖尿病の治療の有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。(30年)

注2) 「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定はp.6参照。

第53表 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況—糖尿病が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%									
総数	2,930	100.0	131	100.0	290	100.0	373	100.0	435	100.0	702	100.0	999	100.0	1,897	100.0	807	100.0	612	100.0
糖尿病が強く疑われる者	385	13.1	0	0.0	2	0.7	18	4.8	43	9.9	126	17.9	196	19.6	254	13.4	150	18.6	129	21.1
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	187	48.6	0	0.0	0	0.0	8	44.4	21	48.8	63	50.0	95	48.5	133	52.4	84	56.0	54	41.9
糖尿病の可能性を否定できない者	463	15.8	2	1.5	11	3.8	22	5.9	59	13.6	129	18.4	240	24.0	322	17.0	189	23.4	128	20.9
上記以外	2,082	71.1	129	98.5	277	95.5	333	89.3	333	76.6	447	63.7	563	56.4	1,321	69.6	468	58.0	355	58.0
総数	1,201	100.0	51	100.0	102	100.0	146	100.0	161	100.0	302	100.0	439	100.0	774	100.0	349	100.0	274	100.0
糖尿病が強く疑われる者	224	18.7	0	0.0	1	1.0	10	6.8	30	18.6	75	24.8	108	24.6	154	19.9	90	25.8	69	25.2
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	122	54.5	0	0.0	0	0.0	6	60.0	18	60.0	41	54.7	57	52.8	93	60.4	57	63.3	29	42.0
糖尿病の可能性を否定できない者	178	14.8	0	0.0	4	3.9	9	6.2	21	13.0	46	15.2	98	22.3	119	15.4	72	20.6	55	20.1
上記以外	799	66.5	51	100.0	97	95.1	127	87.0	110	68.3	181	59.9	233	53.1	501	64.7	187	53.6	150	54.7
総数	1,729	100.0	80	100.0	188	100.0	227	100.0	274	100.0	400	100.0	560	100.0	1,123	100.0	458	100.0	338	100.0
糖尿病が強く疑われる者	161	9.3	0	0.0	1	0.5	8	3.5	13	4.7	51	12.8	88	15.7	100	8.9	60	13.1	60	17.8
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	65	40.4	0	0.0	0	0.0	2	25.0	3	23.1	22	43.1	38	43.2	40	40.0	27	45.0	25	41.7
糖尿病の可能性を否定できない者	285	16.5	2	2.5	7	3.7	13	5.7	38	13.9	83	20.8	142	25.4	203	18.1	117	25.5	73	21.6
上記以外	1,283	74.2	78	97.5	180	95.7	206	90.7	223	81.4	266	66.5	330	58.9	820	73.0	281	61.4	205	60.7

注1) 身体状況調査においてヘモグロビン A1c 値を測定し、身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」, 「(7-1) 現在糖尿病治療の有無」及び「(7-2) 現在の状況」が有効回答の者を集計対象とした。

注2) 判定基準は p.16 参照。
*「服薬者」は、「インスリン注射または血糖を下げる薬の使用」の判定は p. 6 参照。
※年齢調整した、糖尿病が強く疑われる者の割合 (20歳以上) は、男性13.5%、女性6.8%。
年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口 (20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分) を用いて算出した。

「糖尿病が強く疑われる者」の判定
ヘモグロビン A1c の測定値があり、身体状況調査票 (7), (7-1) 及び (7-2) が有効回答の者のうち、ヘモグロビン A1c (NGSP) の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の (7-1) 「現在、糖尿病治療の有無」に「1 有」と回答した者。
「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定
ヘモグロビン A1c の測定値がある者のうち、ヘモグロビン A1c (NGSP) 値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる者」以外の者。

第54表 「糖尿病が強く疑われる者」における治療の有無－糖尿病の治療の有無、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	385	0	0.0	2	100.0	18	100.0	43	100.0	126	100.0	196	100.0	254	100.0	150	100.0	129	100.0
あり	269	0	0.0	1	50.0	10	55.6	30	69.8	86	68.3	142	72.4	178	70.1	109	72.7	90	69.8
なし	116	0	0.0	1	50.0	8	44.4	13	30.2	40	31.7	54	27.6	76	29.9	41	27.3	39	30.2
総数	224	0	0.0	1	100.0	10	100.0	30	100.0	75	100.0	108	100.0	154	100.0	90	100.0	69	100.0
男性	166	0	0.0	1	100.0	7	70.0	23	76.7	54	72.0	81	75.0	116	75.3	68	75.6	49	71.0
なし	58	0	0.0	0	0.0	3	30.0	7	23.3	21	28.0	27	25.0	38	24.7	22	24.4	20	29.0
総数	161	0	0.0	1	100.0	8	100.0	13	100.0	51	100.0	88	100.0	100	100.0	60	100.0	60	100.0
女性	103	0	0.0	0	0.0	3	37.5	7	53.8	32	62.7	61	69.3	62	62.0	41	68.3	41	68.3
なし	58	0	0.0	1	100.0	5	62.5	6	46.2	19	37.3	27	30.7	38	38.0	19	31.7	19	31.7

注1) 身体状況調査においてヘモグロビン A1c 値を測定し、身体状況調査の問診において「(7) これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」, 「(7-1) 現在糖尿病治療の有無」及び「(7-2) 現在の状況」が有効回答の者を集計対象とした。

注2) 「糖尿病が強く疑われる人」の判定基準は p.16 参照。

*身体状況調査票の問診(7-1)「現在糖尿病の治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「有」と回答した者を治療ありとした。

(30年)

第55表 高血圧症有病者の状況－高血圧症有病者の状況、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,129	100.0	140	100.0	306	100.0	400	100.0	459	100.0	752	100.0	1,072	100.0	2,022	100.0	861	100.0	661	100.0
高血圧症有病者	1,564	50.0	5	3.6	24	7.8	85	21.3	197	42.9	451	60.0	802	74.8	1,019	50.4	575	66.8	516	78.1
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	931	59.5	0	0.0	0	0.0	17	20.0	80	40.6	250	55.4	584	72.8	532	52.2	353	61.4	399	77.3
正常高値血圧者	393	12.6	10	7.1	27	8.8	56	14.0	69	15.0	110	14.6	121	11.3	292	14.4	111	12.9	64	9.7
上記以外	1,172	37.5	125	89.3	255	83.3	259	64.8	193	42.0	191	25.4	149	13.9	711	35.2	175	20.3	81	12.3
男性	1,286	100.0	56	100.0	108	100.0	158	100.0	166	100.0	325	100.0	473	100.0	828	100.0	376	100.0	294	100.0
高血圧症有病者	775	60.3	3	5.4	19	17.6	62	39.2	98	59.0	235	72.3	358	75.7	523	63.2	274	72.9	230	78.2
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	449	57.9	0	0.0	0	0.0	13	21.0	47	48.0	131	55.7	258	72.1	276	52.8	172	62.8	173	75.2
正常高値血圧者	177	13.8	8	14.3	16	14.8	27	17.1	24	14.5	45	13.8	57	12.1	121	14.6	50	13.3	32	10.9
上記以外	334	26.0	45	80.4	73	67.6	69	43.7	44	26.5	45	13.8	58	12.3	184	22.2	52	13.8	32	10.9
女性	1,843	100.0	84	100.0	198	100.0	242	100.0	293	100.0	427	100.0	599	100.0	1,194	100.0	485	100.0	367	100.0
高血圧症有病者	789	42.8	2	2.4	5	2.5	23	9.5	99	33.8	216	50.6	444	74.1	496	41.5	301	62.1	286	77.9
(再掲)高血圧症有病者のうち服薬者*	482	61.1	0	0.0	0	0.0	4	17.4	33	33.3	119	55.1	326	73.4	256	51.6	181	60.1	226	79.0
正常高値血圧者	216	11.7	2	2.4	11	5.6	29	12.0	45	15.4	65	15.2	64	10.7	171	14.3	61	12.6	32	8.7
上記以外	838	45.5	80	95.2	182	91.9	190	78.5	149	50.9	146	34.2	91	15.2	527	44.1	123	25.4	49	13.4

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に回答をしている者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。なお、1回しか測定できなかった者については、その値を採用した。

注3) 判定の基準は p.15 参照。

*「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に「有」と回答した者。

「高血圧症有病者」の判定
収縮期血圧 140mmHg以上、または拡張期血圧 90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者。

第56表 「脂質異常症が疑われる者」の状況一脂質異常症が疑われる者の状況、年齢階級別、人数、割合一総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%									
総数	2,939	100.0	134	100.0	291	100.0	376	100.0	435	100.0	699	100.0	1,004	100.0	1,898	100.0	806	100.0	616	100.0
脂質異常症が疑われる者	716	24.4	3	2.2	15	5.2	26	6.9	73	16.8	205	29.3	394	39.2	456	24.0	280	34.7	242	39.3
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	595	83.1	0	0.0	4	26.7	11	42.3	60	82.2	181	88.3	339	86.0	378	82.9	236	84.3	213	88.0
上記以外	2,223	75.6	131	97.8	276	94.8	350	93.1	362	83.2	494	70.7	610	60.8	1,442	76.0	526	65.3	374	60.7
総数	1,200	100.0	52	100.0	103	100.0	146	100.0	160	100.0	301	100.0	438	100.0	773	100.0	349	100.0	272	100.0
脂質異常症が疑われる者	296	24.7	2	3.8	11	10.7	14	9.6	40	25.0	85	28.2	144	32.9	195	25.2	111	31.8	88	32.4
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	207	69.9	0	0.0	1	9.1	4	28.6	29	72.5	66	77.6	107	74.3	137	70.3	79	71.2	69	78.4
上記以外	904	75.3	50	96.2	92	89.3	132	90.4	120	75.0	216	71.8	294	67.1	578	74.8	238	68.2	184	67.6
総数	1,739	100.0	82	100.0	188	100.0	230	100.0	275	100.0	398	100.0	566	100.0	1,125	100.0	457	100.0	344	100.0
脂質異常症が疑われる者	420	24.2	1	1.2	4	2.1	12	5.2	33	12.0	120	30.2	250	44.2	261	23.2	169	37.0	154	44.8
(再掲)脂質異常症が疑われる者のうち服薬者*	388	92.4	0	0.0	3	75.0	7	58.3	31	93.9	115	95.8	232	92.8	241	92.3	157	92.9	144	93.5
上記以外	1,319	75.8	81	98.8	184	97.9	218	94.8	242	88.0	278	69.8	316	55.8	864	76.8	288	63.0	190	55.2

注) HDLコレステロールを測定し、身体状況調査の問診において「(6)(c) コレステロールを下げる薬」、「(6)(d) 中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用状況に回答した者を集計対象とした。

* 「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6)(c) コレステロールを下げる薬」、「(6)(d) 中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」のいずれか、または両方に使用「有」と回答した者。

「脂質異常症が疑われる者」の判定
国民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記のとおりとした。
HDLコレステロールが 40mg/dL 未満、もしくはコレステロールを下げる薬または中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

第57表 運動禁止の有無－運動禁止の有無、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,587	100.0	174	100.0	369	100.0	487	100.0	538	100.0	829	100.0	1,190	100.0	1,911	100.0	1,676	100.0	940	100.0	736	100.0
運動禁止の有	69	1.9	2	1.1	2	0.5	2	0.4	4	0.7	17	2.1	42	3.5	15	0.8	54	3.2	23	2.4	31	4.2
運動禁止の無	3,518	98.1	172	98.9	367	99.5	485	99.6	534	99.3	812	97.9	1,148	96.5	1,896	99.2	1,622	96.8	917	97.6	705	95.8
総数	1,527	100.0	70	100.0	148	100.0	206	100.0	212	100.0	362	100.0	529	100.0	785	100.0	742	100.0	415	100.0	327	100.0
運動禁止の有	36	2.4	2	2.9	0	0.0	1	0.5	2	0.9	9	2.5	22	4.2	8	1.0	28	3.8	13	3.1	15	4.6
運動禁止の無	1,491	97.6	68	97.1	148	100.0	205	99.5	210	99.1	353	97.5	507	95.8	777	99.0	714	96.2	402	96.9	312	95.4
総数	2,060	100.0	104	100.0	221	100.0	281	100.0	326	100.0	467	100.0	661	100.0	1,126	100.0	934	100.0	525	100.0	409	100.0
運動禁止の有	33	1.6	0	0.0	2	0.9	1	0.4	2	0.6	8	1.7	20	3.0	7	0.6	26	2.8	10	1.9	16	3.9
運動禁止の無	2,027	98.4	104	100.0	219	99.1	280	99.6	324	99.4	459	98.3	641	97.0	1,119	99.4	908	97.2	515	98.1	393	96.1

注) 身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に回答した者を集計対象とした。(30年)

第58表 1週間の運動日数－1週間の運動日数、年齢階級別、人数、割合－総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,466	100.0	170	100.0	361	100.0	480	100.0	529	100.0	801	100.0	1,125	100.0	1,874	100.0	1,592	100.0	903	100.0	689	100.0
運動無し	1,737	50.1	115	67.6	247	68.4	297	61.9	300	56.7	363	45.3	415	36.9	1,121	59.8	616	38.7	353	39.1	263	38.2
1日/週	332	9.6	21	12.4	30	8.3	57	11.9	55	10.4	80	10.0	89	7.9	203	10.8	129	8.1	77	8.5	52	7.5
2日/週	271	7.8	8	4.7	25	6.9	36	7.5	45	8.5	63	7.9	94	8.4	141	7.5	130	8.2	73	8.1	57	8.3
3日/週	265	7.6	12	7.1	21	5.8	27	5.6	29	5.5	75	9.4	101	9.0	119	6.4	146	9.2	90	10.0	56	8.1
4日/週	138	4.0	4	2.4	9	2.5	9	1.9	21	4.0	37	4.6	58	5.2	52	2.8	86	5.4	54	6.0	32	4.6
5日/週	163	4.7	4	2.4	14	3.9	21	4.4	23	4.3	41	5.1	60	5.3	83	4.4	80	5.0	44	4.9	36	5.2
6日/週	75	2.2	1	0.6	1	0.3	7	1.5	11	2.1	20	2.5	35	3.1	27	1.4	48	3.0	23	2.5	25	3.6
7日/週	485	14.0	5	2.9	14	3.9	26	5.4	45	8.5	122	15.2	273	24.3	128	6.8	357	22.4	189	20.9	168	24.4
総数	1,466	100.0	68	100.0	147	100.0	202	100.0	206	100.0	347	100.0	496	100.0	767	100.0	699	100.0	395	100.0	304	100.0
運動無し	716	48.8	42	61.8	87	59.2	117	57.9	115	55.8	171	49.3	184	37.1	438	57.1	278	39.8	157	39.7	121	39.8
1日/週	134	9.1	8	11.8	19	12.9	23	11.4	22	10.7	29	8.4	33	6.7	85	11.1	49	7.0	31	7.8	18	5.9
2日/週	110	7.5	5	7.4	15	10.2	18	8.9	16	7.8	23	6.6	33	6.7	66	8.6	44	6.3	24	6.1	20	6.6
3日/週	100	6.8	7	10.3	6	4.1	11	5.4	12	5.8	27	7.8	37	7.5	45	5.9	55	7.9	34	8.6	21	6.9
4日/週	57	3.9	2	2.9	4	2.7	5	2.5	5	2.4	16	4.6	25	5.0	21	2.7	36	5.2	22	5.6	14	4.6
5日/週	84	5.7	0	0.0	9	6.1	11	5.4	14	6.8	21	6.1	29	5.8	47	6.1	37	5.3	21	5.3	16	5.3
6日/週	31	2.1	1	1.5	0	0.0	5	2.5	4	1.9	6	1.7	15	3.0	11	1.4	20	2.9	8	2.0	12	3.9
7日/週	234	16.0	3	4.4	7	4.8	12	5.9	18	8.7	54	15.6	140	28.2	54	7.0	180	25.8	98	24.8	82	27.0
総数	2,000	100.0	102	100.0	214	100.0	278	100.0	323	100.0	454	100.0	629	100.0	1,107	100.0	893	100.0	508	100.0	385	100.0
運動無し	1,021	51.1	73	71.6	160	74.8	180	64.7	185	57.3	192	42.3	231	36.7	683	61.7	338	37.8	196	38.6	142	36.9
1日/週	198	9.9	13	12.7	11	5.1	34	12.2	33	10.2	51	11.2	56	8.9	118	10.7	80	9.0	46	9.1	34	8.8
2日/週	161	8.1	3	2.9	10	4.7	18	6.5	29	9.0	40	8.8	61	9.7	75	6.8	86	9.6	49	9.6	37	9.6
3日/週	165	8.3	5	4.9	15	7.0	16	5.8	17	5.3	48	10.6	64	10.2	74	6.7	91	10.2	56	11.0	35	9.1
4日/週	81	4.1	2	2.0	5	2.3	4	1.4	16	5.0	21	4.6	33	5.2	31	2.8	50	5.6	32	6.3	18	4.7
5日/週	79	4.0	4	3.9	5	2.3	10	3.6	9	2.8	20	4.4	31	4.9	36	3.3	43	4.8	23	4.5	20	5.2
6日/週	44	2.2	0	0.0	1	0.5	2	0.7	7	2.2	14	3.1	20	3.2	16	1.4	28	3.1	15	3.0	13	3.4
7日/週	251	12.6	2	2.0	7	3.3	14	5.0	27	8.4	68	15.0	133	21.1	74	6.7	177	19.8	91	17.9	86	22.3

注) 身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。

(30年)

第59表 運動を行う日の平均運動時間—運動を行う日の平均運動時間の区分、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	1,729	100.0	55	100.0	114	100.0	183	100.0	229	100.0	438	100.0	710	100.0	753	100.0	976	100.0	550	100.0	426	100.0
30分未満	246	14.2	4	7.3	18	15.8	24	13.1	34	14.8	61	13.9	105	14.8	101	13.4	145	14.9	81	14.7	64	15.0
30分以上60分未満	484	28.0	9	16.4	26	22.8	38	20.8	65	28.4	145	33.1	201	28.3	195	25.9	289	29.6	164	29.8	125	29.3
60分以上120分未満	630	36.4	21	38.2	51	44.7	74	40.4	86	37.6	144	32.9	254	35.8	290	38.5	340	34.8	190	34.5	150	35.2
120分以上180分未満	270	15.6	14	25.5	16	14.0	34	18.6	32	14.0	63	14.4	111	15.6	126	16.7	144	14.8	82	14.9	62	14.6
180分以上	99	5.7	7	12.7	3	2.6	13	7.1	12	5.2	25	5.7	39	5.5	41	5.4	58	5.9	33	6.0	25	5.9
総数	750	100.0	26	100.0	60	100.0	85	100.0	91	100.0	176	100.0	312	100.0	329	100.0	421	100.0	238	100.0	183	100.0
男性	84	11.2	2	7.7	7	11.7	13	15.3	14	15.4	18	10.2	30	9.6	41	12.5	43	10.2	25	10.5	18	9.8
女性	186	24.8	3	11.5	10	16.7	13	15.3	23	25.3	53	30.1	84	26.9	68	20.7	118	28.0	68	28.6	50	27.3
総数	296	39.5	11	42.3	31	51.7	36	42.4	34	37.4	66	37.5	118	37.8	140	42.6	156	37.1	83	34.9	73	39.9
30分未満	132	17.6	7	26.9	10	16.7	18	21.2	15	16.5	24	13.6	58	18.6	60	18.2	72	17.1	42	17.6	30	16.4
60分以上120分未満	52	6.9	3	11.5	2	3.3	5	5.9	5	5.5	15	8.5	22	7.1	20	6.1	32	7.6	20	8.4	12	6.6
180分以上	979	100.0	29	100.0	54	100.0	98	100.0	138	100.0	262	100.0	398	100.0	424	100.0	555	100.0	312	100.0	243	100.0
女性	162	16.5	2	6.9	11	20.4	11	11.2	20	14.5	43	16.4	75	18.8	60	14.2	102	18.4	56	17.9	46	18.9
30分以上60分未満	288	30.4	6	20.7	16	29.6	25	25.5	42	30.4	92	35.1	117	29.4	127	30.0	171	30.8	96	30.8	75	30.9
60分以上120分未満	334	34.1	10	34.5	20	37.0	38	38.8	52	37.7	78	29.8	136	34.2	150	35.4	184	33.2	107	34.3	77	31.7
120分以上180分未満	138	14.1	7	24.1	6	11.1	16	16.3	17	12.3	39	14.9	53	13.3	66	15.6	72	13.0	40	12.8	32	13.2
180分以上	47	4.8	4	13.8	1	1.9	8	8.2	7	5.1	10	3.8	17	4.3	21	5.0	26	4.7	13	4.2	13	5.3

注) 身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者のうち、(9)(a)「1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計対象とした。(30年)

第60表 運動習慣の有無—運動習慣の有無、年齢階級別、人数、割合—総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	3,466	100.0	170	100.0	361	100.0	480	100.0	529	100.0	801	100.0	1,125	100.0	1,874	100.0	1,592	100.0	903	100.0	689	100.0
運動の習慣有	976	28.2	20	11.8	47	13.0	78	16.3	116	21.9	252	31.5	463	41.2	350	18.7	626	39.3	348	38.5	278	40.3
運動の習慣無	2,490	71.8	150	88.2	314	87.0	402	83.8	413	78.1	549	68.5	662	58.8	1,524	81.3	966	60.7	555	61.5	411	59.7
総数	1,466	100.0	68	100.0	147	100.0	202	100.0	206	100.0	347	100.0	496	100.0	767	100.0	699	100.0	395	100.0	304	100.0
男性	466	31.8	12	17.6	28	19.0	37	18.3	48	23.3	114	32.9	227	45.8	166	21.6	300	42.9	165	41.8	135	44.4
女性	1,000	68.2	56	82.4	119	81.0	165	81.7	158	76.7	233	67.1	269	54.2	601	78.4	399	57.1	230	58.2	169	55.6
総数	2,000	100.0	102	100.0	214	100.0	278	100.0	323	100.0	454	100.0	629	100.0	1,107	100.0	893	100.0	508	100.0	385	100.0
運動の習慣有	510	25.5	8	7.8	19	8.9	41	14.7	68	21.1	138	30.4	236	37.5	184	16.6	326	36.5	183	36.0	143	37.1
運動の習慣無	1,490	74.5	94	92.2	195	91.1	237	85.3	255	78.9	316	69.6	393	62.5	923	83.4	567	63.5	325	64.0	242	62.9

注) 身体状況調査の問診において(8)「医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、(9)のすべての質問に回答した者を集計対象とした。(30年)

※「運動の習慣有」とは、身体状況調査の問診(9)で1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

※年齢調整した、運動習慣のある者の割合(20歳以上)は、男性27.2%、女性21.1%。

年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第61表 歩数の平均値及び標準偏差—年齢級別、人数、平均値、標準偏差—総数・男性・女性、20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			(再掲) 20-64歳			(再掲) 65歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差			
総数	5,356	6,340	4,021	410	7,332	4,322	634	7,158	4,034	861	7,211	3,974	875	7,229	4,407	1,139	6,314	3,560	1,437	4,652	3,481	3,282	7,147	4,102	2,074	5,062	3,532	1,201	5,824	3,585	873	4,014	3,173
男性	2,500	6,794	4,428	201	7,913	4,893	296	8,141	4,448	417	7,556	4,419	400	7,727	5,209	532	6,463	3,652	654	5,053	3,695	1,546	7,644	4,627	954	5,417	3,692	557	6,026	3,692	397	4,563	3,525
女性	2,856	5,942	3,582	209	6,772	3,617	338	6,298	3,416	444	6,888	3,480	475	6,809	3,549	607	6,184	3,475	783	4,317	3,256	1,736	6,705	3,514	1,120	4,759	3,361	644	5,649	3,483	476	3,556	2,769

注) 栄養摂取状況調査票の身体状況「1日の身体活動数(歩数)」及び「歩数計の装着状況」の両方に回答した者を集計対象とした。なお、歩数が100歩未満、50,000歩以上の者を除外した。(30年)
 ※年齢調整した、歩数の平均値(20歳以上)は、男性7,035歩/日、女性6,115歩/日。
 年齢調整値は、平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。