

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본국 외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

복용하실 때에는 이 첨부문서(설명문서)를 반드시 읽어주십시오.  
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

# ピシヤット®

제②종 의약품

지사제

피샷토 지사제 OD정(ピシヤット下痢止めOD錠)

## 특징

- 피샷토 지사제 OD정은 로페라미드염산염이 장에 직접 작용하여 연동운동을 억제하고 장 속의 수분분비를 억제하여 설사를 개선하는 의약품입니다.
- 통근/통학 중이나 회의 도중에 찾아오는 갑작스러운 설사에 물이 없어도 복용할 수 있는 구강내봉괴정(OD정)으로 입속에서 부드럽게 녹기 때문에 어디서나 간단하게 복용할 수 있습니다.
- 과식이나 과음, 수면 중 오한 등으로 인한 견디기 힘든 설사에는 1회 1정만으로 효과가 있는 피샷토 지사제 OD정을 추천해 드립니다.

## ⚠ [복용상 주의사항]

### 금지사항

(지키지 않는 경우 현재의 증상이 악화하거나 부작용, 사고가 일어나기 쉽습니다)

1. 다음 환자는 복용하지 마십시오.
  - (1) 이 약 또는 이 약의 성분으로 인한 알레르기 증상이 생긴 적이 있는 환자
  - (2) 만 15세 미만의 어린이
  - (3) 페닐케톤뇨증 환자  
(이 약은 L-페닐알라닌화합물을 함유하고 있습니다)
2. 이 약을 복용하는 동안에는 다음 의약품을 복용하지 마십시오.  
위장진통 / 진경제
3. 복용 후에 자동차나 기계류의 운전 및 조작을 하지 마십시오.  
(졸음이 있을 수 있습니다)
4. 복용 전후에는 음주를 하지 마십시오.

### 상담이 필요한 경우

1. 다음 환자는 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.
  - (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - (2) 발열을 수반한 설사 환자, 혈변이 있는 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
  - (3) 급성의 심한 설사 또는 복통/복부팽만/메스꺼움 등의 증상을 수반한 설사 환자  
(이 약으로 무리하게 설사를 멈추면 오히려 병을 악화시킬 수도 있습니다)
  - (4) 변비를 피해야 하는 항문질환 등이 있는 환자  
(이 약을 복용하여 변비가 생길 수도 있습니다)
  - (5) 임신부 또는 임신을 하고 있을 것이라고 생각되는 환자
  - (6) 수유중인 환자
  - (7) 고령자
  - (8) 약 등으로 알레르기 증상이 생긴 적이 있는 환자
2. 복용 후에 다음 증상이 나타난 경우에는 부작용 우려가 있으니 즉시 복용을 중지하고 이 첨부 문서(설명서)를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.

관련 부위	증상
피부	발진 또는 발적, 가려움, 부종
소화기	식욕부진, 복통, 메스꺼움, 복부 팽만감, 변비, 복부 불쾌감, 구토
정신신경계	현기증

( 뒷면으로 이어집니다. )

드물게 아래와 같은 위독한 증상이 나타날 수 있습니다. 그 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

증상의 명칭	증상
쇼크 (아나필락시스)	복용 후 즉시 피부의 가려움, 두드러기, 신 목소리, 재채기, 목의 가려움, 숨막힘, 가슴 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타남
피부점막안증후군 (스티븐 존슨 증후군) 중독성 표피 괴사용해증	고열, 눈의 충혈, 눈곱, 입술의 짓무름, 인후통, 피부의 광범위한 발진 또는 발적 등이 지속되거나 급격하게 악화됨
일레우스 유사증상 (장폐색 유사증상)	극심한 복통, 가스 배출(방귀)의 정지, 구토, 복부팽만감을 수하는 현저한 변비가 나타남

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수가 있으니, 이런 증상이 지속되거나 계속해서 강해지는 경우에는 복용을 중지하고 이 첨부문서(설명서)를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.

변비, 졸음

4. 2~3일간 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 첨부문서(설명서)를 갖고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담해 주십시오.

#### 효능·효과

과식·과음으로 인한 설사, 수면 중 오한으로 인한 설사

#### 용법·용량

다음 양을 입속에서 녹여서 복용하거나 물 또는 뜨거운 물로 복용하십시오. 복용 간격은 4시간 이상 비워주십시오. 그리고 설사가 멈추면 복용하지 마십시오.

연령	1회량	복용 횟수
성인 (만 15세 이상)	1정	1일 2회
만 15세 미만	복용하지 마십시오	

#### <용법/용량에 대한 주의점>

(1)정해진 용법/용량(1회 1정, 1일 2회)를 반드시 지켜주십시오.

(2)알약을 꺼내는 방법

오른 쪽 그림처럼 알약이 들어 있는 PTP 시트의 돌출 부분을 손가락 끝으로 강하게 밀어서 뒷면의 알루미늄 포장을 찢은 후 꺼내어 복용해 주십시오. (실수로 그대로 삼키면 식도의 점막을 찌르는 등 생각지도 못한 사고로 이어질 수 있습니다.)



#### 성분·분량

●본 약품은 2정(성인 하루 분량)에 다음 성분을 함유하고 있습니다.

로페라미드염산염: 1mg

첨가물: D-만니톨, 메타규산알루미늄Mg하이드록시프로필셀룰로스, 탄닌산, 크로스포비돈, 아스파탐(L-페닐알라닌화합물), 구연산수화물, 1-멘톨, 향료, 스테아린산Mg

#### 보관 및 취급상 주의점

(1)직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에서 보관해 주십시오.

(2)어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 보관해 주십시오.

(3)다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.

(오용의 원인이 되거나 품질이 변합니다.)

(4)표시된 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.

발매원

**타이코약품주식회사**

564-0032 오사카부 스이타시 우치혼마치 3초메 34번 13호

제조판매원

**테이카제약주식회사**

도야마현 도야마시 아라카와1초메 3번 27호