



の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳まで
女の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が
済んだらチェックを
いれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2024年4月版

| 生まれ | | 0歳 | 6週 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月~11カ月 | 12カ月~15カ月 | 16カ月~17カ月 | 18カ月~23カ月 | 2歳 | 3歳 |
|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| B型肝炎 定期 不活化 皮下注射 | ユニバーサル 母子感染予防 | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | ①-②は27日(4週)以上あける | | | ③ <input checked="" type="checkbox"/> | ①-③は139日(20週)以上あける | | | | | | |
| | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | 母親がHBs抗原陽性の場合は接種 | | | | ③ <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| ロタウイルス 定期 生 経口 | 1価 | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | ①-②は4週以上あける ②は生後24週0日までに完了する | | | | | | | | | | |
| | 5価 | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | ③ <input checked="" type="checkbox"/> | ①-②-③は4週以上あける ③は生後32週0日までに完了する | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射 | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | ③ <input checked="" type="checkbox"/> | ①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける | | | | | ④ <input checked="" type="checkbox"/> | ③-④は60日(2カ月)以上あけて、標準として1歳~1歳3カ月で接種 | | | |
| 5種混合(DPT-IPV-Hib) 定期 不活化 皮下注射 | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | ③ <input checked="" type="checkbox"/> | ①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける | | | | | ④ <input checked="" type="checkbox"/> | ③-④は6カ月以上あけ、③終了後6~18カ月の間に接種 ※1歳を超えたら早期接種を推奨 | | | |
| 3種混合(DPT) 任意 不活化 皮下注射 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射 | | | | | | | | | | | | | | | | 11歳に定期接種 |
| ポリオ(IPV) 任意 不活化 皮下注射 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | ③ <input checked="" type="checkbox"/> | ①-②-③はそれぞれ27~56日(4~8週)あける | | | | | ④ <input checked="" type="checkbox"/> | ③-④は7~13カ月あける | | | |
| 4種混合(DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | ③ <input checked="" type="checkbox"/> | ①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける | | | | | ④ <input checked="" type="checkbox"/> | ③-④は6カ月以上あけ、③終了後12~18カ月の間に接種 | | | |
| BCG 定期 生 経皮スタンプ | | | | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射 | | | | | | | | | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | 就学前に2回目接種 | | | |
| 水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射 | | | | | | | | ①-②は3カ月以上 標準的には6~12カ月あける | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | | ② <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| おたふくかぜ 任意 生 皮下注射 | | | | | | | | | | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 日本脳炎 定期 不活化 皮下注射 | | | | | 生後6カ月から接種可能 | | | | | | | ①-②は6~28日(1~4週)あける③を4歳、④を9歳に接種 | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | |
| インフルエンザ 任意 | 1-2 (1年毎) | | | | 生後6カ月から接種可能 | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | 毎年10、11月などに接種 ①-②は2~4週あける | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> | | | ① <input checked="" type="checkbox"/> | ② <input checked="" type="checkbox"/> |
| 新型コロナウイルス 任意 | ※ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトパピローマウイルス 不活化 筋注 | 9価 定期 | | | | | | | | | | | | | | | 中学1年生(女子)に2回接種 |
| | 2価・4価 定期接種可能 | | | | | | | | | | | | | | | 中学1年生(女子)に3回接種 |

CHECK
5種混合(4回)
又は
4種混合とHib
(それぞれ4回)

年齢によって使用できる
製剤が異なるため、
医師に相談のうえ接種



の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳まで
男の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が済んだらチェックをいれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2024年4月版

生まれ

| ワクチン名 | 接種回数 | 0歳 | 6週 | 2カ月 | 3カ月 | 4カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 7カ月 | 8カ月 | 9カ月~11カ月 | 12カ月~15カ月 | 16カ月~17カ月 | 18カ月~23カ月 | 2歳 | 3歳 |
|--|--------------|----|----|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|---|-----------|----|----------|
| B型肝炎 定期 不活化 皮下注射 | ユニバーサル | | | 1 | 2 | ①-②は27日(4週)以上あける | | | 3 | ①-③は139日(20週)以上あける | | | | | | |
| | 母子感染予防 | 1 | 2 | 母親がHBs抗原陽性の場合は接種 | | | | 3 | | | | | | | | |
| ロタウイルス 定期 生 経口 | 1価 | | | 1 | 2 | ①-②は4週以上あける ②は生後24週0日までに完了する | | | | | | | | | | |
| | 5価 | | | 1 | 2 | 3 | ①-②-③は4週以上あける ③は生後32週0日までに完了する | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | ①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける | | | | | 4 | ③-④は60日(2カ月)以上あけて、標準として1歳~1歳3カ月で接種 | | | |
| 5種混合(DPT-IPV-Hib) 定期 不活化 皮下注射 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | ①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける | | | | | 4 | ③-④は6カ月以上あけ、③終了後6~18カ月の間に接種 ※1歳を超えたら早期接種を推奨 | | | |
| 3種混合(DPT) 任意 不活化 皮下注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 11歳に定期接種 |
| ポリオ(IPV) 任意 不活化 皮下注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | ①-②-③はそれぞれ27~56日(4~8週)あける | | | | | 4 | ③-④は7~13カ月あける | | | |
| 4種混合(DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | ①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける | | | | | 4 | ③-④は6カ月以上あけ、③終了後12~18カ月の間に接種 | | | |
| BCG 定期 生 経皮スタンプ | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 就学前に2回目接種 | | | |
| 水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射 | 2 | | | | | | | ①-②は3カ月以上 標準的には6~12カ月あける | | | | 1 | | 2 | | |
| おたふくかぜ 任意 生 皮下注射 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 日本脳炎 定期 不活化 皮下注射 | 4 | | | | 生後6カ月から接種可能 | | | | | | | ①-②は6~28日(1~4週)あける③を4歳、④を9歳に接種 | | 1 | 2 | |
| インフルエンザ 任意 | 1-2 (1年毎) | | | | 生後6カ月から接種可能 | | 1 | 2 | 毎年10、11月などに接種 ①-②は2~4週あける | | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
| 新型コロナウイルス 任意 | ※ | | | | | | | | | | | | | | | |

CHECK

5種混合(4回) 又は 4種混合とHib(それぞれ4回)

年齢によって使用できる製剤が異なるため、医師に相談のうえ接種

MEMO



の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳以降
女の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が
済んだらチェックを
いれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2024年4月版

| 生まれ | | 接種回数 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ～ | |
|--|------------------|--------------|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| B型肝炎 定期 不活化 皮下注射 | ユニバーサル 母子感染予防 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1価 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス 定期 生 経口 | 5価 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5種混合(DPT-IPV-Hib) 定期 不活化 皮下注射 | | 4 | 7.5歳まで | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3種混合(DPT) 任意 不活化 皮下注射 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2種混合(DT) 定期 不活化 皮下注射 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| ポリオ(IPV) 任意 不活化 皮下注射 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌b型(ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4種混合(DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | | 4 | 7.5歳まで | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG 定期 生 経皮スタンプ | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| おたふくかぜ 任意 生 皮下注射 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 定期 不活化 皮下注射 | | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| インフルエンザ 任意 | | 1-2 (1年毎) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 新型コロナウイルス 任意 | | * | 年齢によって使用できる製剤が異なるため、医師に相談のうえ接種 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトパピローマウイルス 不活化 筋注 | 9価 定期 | 2 または3 | 1997年4月2日~2006年4月1日 生まれの方は2022~2024年度 の3年間に限り接種が可能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2価・4価 定期接種可能 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

定期 定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します(公費、一部負担あり)。任意 任意接種：希望者が各自で受けます(自己負担、自治体によっては助成金が出る場合あり)。不活化 不活化ワクチン 生 生ワクチン mRNA mRNAワクチン



の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

3歳以降
男の子用



- 定期接種の推奨期間
- 任意接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間
- 健康保険での接種可能な期間

ワクチン接種が済んだらチェックをいれましょう!



実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

参考資料：日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2024年4月版

生まれ

| ワクチン名 | 接種回数 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ～ |
|--|------------------|--------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| B型肝炎 定期 不活化 皮下注射 | ユニバーサル 母子感染予防 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロタウイルス 定期 生 経口 | 1価 5価 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5種混合 (DPT-IPV-Hib) 定期 不活化 皮下注射 | 4 | | 7.5歳まで | | | | | | | | | | | | | | |
| 3種混合 (DPT) 任意 不活化 皮下注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2種混合 (DT) 定期 不活化 皮下注射 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| ポリオ (IPV) 任意 不活化 皮下注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4種混合 (DPT-IPV) ※4種混合ワクチンで初回接種する場合 定期接種可能 不活化 皮下注射 | 4 | | 7.5歳まで | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG 定期 生 経皮スタンプ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MR (麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射 | 2 | | 就学前1年間 | | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘 (みずぼうそう) 定期 生 皮下注射 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| おたふくかぜ 任意 生 皮下注射 | 1 | | 就学前1年間 | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 定期 不活化 皮下注射 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ 任意 | 1-2 (1年毎) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新型コロナウイルス 任意 | ※ | | | | | | | | | | | | | | | | |

MEMO
